

产于四川北部和东北部、甘肃南部、青海(互助)、陕西南部、山西南部。海拔 1350—2300 米山地、沟谷或河边阔叶林中,寄生于山杨或山楂等植物上。模式标本采自四川城口。

本种近似槲寄生,但区别是枝的节间细长,叶线形,通常宽 2—4 毫米,嫩叶更狭,本种原始记载雌花和雄花同株,实误。

4. 绿茎槲寄生(云南植物志)

Viscum nudum Danser in Blumea **4**: 275. 1941; 云南植物志 **3**: 378. 1983.

灌木,高 0.3—0.5 米;茎圆柱状,绿色或黄绿色,二歧地或三歧地分枝,枝的节间长 4—8 厘米,粗 2—5 毫米,干后具皱纹。叶退化呈鳞片状,长 0.5—1 毫米。雌雄异株;雌、雄花序均聚伞式穗状,顶生或腋生于茎叉状分枝处,总花梗长 2—5 毫米,通常具花 3—5 朵,顶生的花具 2 枚苞片,交叉对生的花各具一枚苞片;苞片三角形,长 1 毫米,具短缘毛或全缘;雄花:花蕾时卵球形,长约 3 毫米,黄色,萼片 4 枚,卵状三角形;花药椭圆形,长约 1.5 毫米;雌花:花蕾时长卵球形,长 2—2.5 毫米,花托卵球形;萼片 4 枚,三角形,长约 0.5 毫米;柱头乳头状。果卵球形,长 5—6 毫米,直径 4 毫米,黄绿色,果皮平滑。花期 12—3 月,果期 8—10 月。

产于云南、四川、贵州西北部。海拔 2150—3800 米山地阔叶林中,寄生于杨属、柳属、榛属或化香树、滇青冈、桦树、梨树、桃树等植物上。模式标本采自四川康定。

全株入药,有祛风湿、安胎等功效(四川甘孜)。

组 2. 腋花槲寄生组——Sect. Botryoviscum Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. **1**: 140. 1897; Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **16** b: 201. 1935.

雌雄同株植物。聚伞花序腋生,偶顶生,雌花和雄花同序,具不定花芽或无不定花芽。

模式种:扁枝槲寄生 *Viscum articulatum* Brum. f.

本组约 60 种,我国产 8 种。

5. 云南槲寄生(植物分类学报)

Viscum yunnanense H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **22** (3): 206, f. 1. 1984.

亚灌木,高约 0.6 米;枝交叉对生,圆柱状,节间长 2—4.5 厘米,粗 2—3 毫米,具细纵棱。叶对生,薄革质,椭圆形或披针形,长 6—8 厘米,宽 2—3.5 厘米,顶端钝或渐尖,基部渐狭,基出脉 5 条;叶柄短。扇形,聚伞花序,2—3 个腋生,总花梗长 2—3 毫米,总苞舟形,长约 3 毫米,具花 5—7 朵;花排列成一行,中央一朵为雄花,侧生的均为雌花;雄花:花蕾时卵球形,长约 2 毫米,花托长 1 毫米;萼片 4 枚,三角形,长 1 毫米;花药椭圆形,长 0.5 毫米;雌花:花蕾时椭圆状,长 2—2.5 毫米,花托长 1.5—2 毫米;萼片 4 枚,三角形,长约 0.5 毫米;柱头乳头状。果序具果 4—6 个,果椭圆状,长 5 毫米,直径约 2.5 毫米,顶端钝,黄