

2. 花被 1 轮; 心皮全部合生; 蒴果浆果状或长角果状。
3. 雄蕊 12 枚, 排成 2 轮; 花单生; 蒴果浆果状; 多年生草本 (2. 细辛族 Trib. Asareae Spach. 2. 细辛属 *Asarum* L.
3. 雄蕊 6—12 枚, 排成 1 轮; 总状、聚伞、伞房或蝎尾状聚伞花序; 蒴果长角果状; 灌木或亚灌木 (3. 线果兜铃族 Trib. Bragantiacae Klotzsch) 3. 线果兜铃属 *Thottea* Kottb.
1. 花被两侧对称, 花被管通常弯曲, 裂片常偏斜或单侧; 藤本、亚灌木或小乔木 (2. 马兜铃亚科 Subfam. Aristolochioideae) (4. 马兜铃族 Trib. Aristolochiaceae) 4. 马兜铃属 *Aristolochia* L.

1. 细辛亚科——Subfam. ASAROIDEAE

O. C. Schmidt in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. ed. 2. 16(b): 228. 1935.

花被辐射对称, 1 轮, 稀 2 轮; 花被裂片常近相等; 雄蕊排成 1—2 轮; 心皮合生, 稀仅基部合生, 蒴果浆果状或蓇葖果状; 种子扁平或三角形; 草本, 少为灌木或亚灌木。

本亚科我国产 3 族。

1. 马蹄香族——Trib. Sarumaeae

O. C. Schmidt in Engl. u. Prantl l. c. 228. 1935.

花被片 6 枚, 2 轮; 蒴果蓇葖状。

本族仅一属。

1. 马蹄香属——*Saruma* Oliv.

Oliv. in Hook. Icon. Pl. 19: Pl. 1895. 1889.

多年生直立草本; 地下部分具芳香气味; 具明显的地上茎。叶互生, 心形。花单生, 具花梗; 花被 2 轮, 花萼基部与子房合生, 萼片 3, 卵圆形; 花瓣 3, 稍比花萼大; 雄蕊通常 12 枚, 排成 2 轮, 花丝较花药长, 先端膨大内曲, 花药内向纵裂; 子房半下位, 心皮 6, 下部合生, 上部离生。蒴果蓇葖状, 花萼宿存; 种子背侧面圆凸, 具横皱纹。

为我国特有属, 1 种, 产于中南、西南及西北各地。

1. 马蹄香(唐本草) 冷水丹(陕西), 高脚细辛(四川东部), 狗肉香(贵州) 图版 44: 5—12

Saruma henryi Oliv. in Hook. Icon. Pl. 19: pl. 1895. 1889; Hemsl. in Gard. Chron. ser. 3, 7: 422. 1890, et in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 360. 1891; 秦岭植物志 1(2): 129. 图 110. 1974; 湖北植物志 1(2): 129. 图 281. 1976.

多年生直立草本, 茎高 50—100 厘米, 被灰棕色短柔毛, 根状茎粗壮, 直径约 5 毫米;