

Hist. Nat. Paris 1: 65. 1895.

与原变种区别为叶面有白色点状花斑;花期较早,3月即行开花。

产于四川、贵州和云南。生于海拔500—1200米林下阴湿地。模式标本采自云南。

2. 肾叶细辛(新拟) 马蹄香(安徽)

Asarum renicordatum C. Y. Cheng et C. S. Yang in Journ. Arn. Arb. 64: 569. f. 1. 1983.

多年生草本;根状茎斜伸,粗约3毫米,有多条纤维根。叶2片,对生,叶片肾状心形,长3—4厘米,宽6—7.5厘米,先端钝圆,基部心形,两侧裂片长约2厘米,宽约3厘米,顶端圆形,常内弯与叶柄靠近,叶面散生短柔毛,叶背及边缘的毛较密;叶柄长10—14厘米,被柔毛;芽苞叶阔卵形,长约1厘米。花生于二叶之间;花梗长约2.5厘米,密生柔毛;花被裂片下部靠合如管状,管长约10毫米,直径约12毫米,外被柔毛,花被裂片上部三角状披针形,长约10毫米,宽约4毫米,先端渐窄成一窄长尖头或短尖头,长2—4毫米;雄蕊与花柱等长或稍长,花丝长约1毫米,药隔锥尖;花柱合生,顶端6裂,裂片常内凹呈倒心形,柱头常位于裂片凹缝处。花期5月。

产于安徽(黄山、九华山)。生于海拔720米处山地水沟旁。模式标本采自安徽黄山。全草入药。

本种接近尾花细辛 *A. caudigerum* Hance, 但叶片为肾状心形,花被裂片顶端渐窄成一长尖头。花柱顶端常裂为6个倒心形裂片,柱头位于心形凹处。

系2. 反被细辛系——Ser. *Japonasarum* (Nakai) C. Y. Cheng et C. S. Yang in Journ. Arn. Arb. 64: 569. 1983——Genus *Japonasarum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 16. 1936.——Sect. *Japonasarum* (Nakai) Araki in Acta Phytotax. Geobot. 6: 125. 1937.

花被裂片反折,先端急尖或短渐尖,不成尾状。

本系我国有2种。

3. 长毛细辛(中国高等植物图鉴) 白毛细辛(湖北植物志), 毛乌金(湖北), 牛毛细辛(四川) 图版36: 1—4

Asarum pulchellum Hemsl. in Gard. Chron. ser. 3, 7: 422. 1890. et in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 360. 1891; Diels in Bot. Jahrb. 29: 308. 1901; Franch. in Journ. de Bot. 12: 302. 1898; 湖北植物志1: 204. 图271. 1976; 中国高等植物图鉴补编1: 238. 图8490. 1982.

多年生草本,全株密生白色长柔毛(干后变黑棕色);根状茎长可达50厘米,斜升或横走,地上茎长3—7厘米,多分枝。叶对生,1—2对,叶片卵状心形或阔卵形,长5—8厘米,宽5—9.5厘米,先端急尖或渐尖,基部心形,两侧裂片长1—2.5厘米,宽2—3厘米,顶端圆形,两面密生长柔毛;叶柄长10—22厘米,有长柔毛;芽苞叶卵形,长1.5—2厘米,宽约