

Asarum sagittarioides C. F. Liang in Act. Phytotax. Sin. 13(2): 23. pl. 5. 7—11. 1975; 中国高等植物图鉴补编 1: 246. 图 8502. 1982.

多年生草本; 根状茎短; 根丛生, 稍肉质, 直径 2—3 毫米。叶片长卵形、阔卵形或近三角状卵形, 长 15—25 厘米, 宽 11—14 厘米, 先端渐尖, 基部耳状心形或耳形, 两侧裂片长 6—11 厘米, 宽 4—6 厘米, 通常外展, 叶面深绿色, 偶有云斑, 叶背初具短毛, 后毛逐渐脱落; 叶柄长 15—25 厘米; 芽苞叶卵形, 长约 1 厘米, 宽约 5 毫米, 边缘有密生睫毛。花单生, 每花枝常具 2 朵花, 紫绿色, 直径 2.5—3 厘米, 花梗长约 1.5 厘米, 稀达 6 厘米; 花被管圆筒状, 长 1.5—2.5 厘米, 直径 7—12 毫米, 喉部缢缩, 膜环宽约 2 毫米, 内壁有纵行脊皱, 花被裂片卵状肾形, 长 10—14 毫米, 宽 12—18 毫米, 基部有乳突皱褶区; 药隔伸出, 锥尖或短舌状; 子房半下位, 花柱离生, 顶端 2 裂, 柱头侧生。果卵圆状, 直径 10—15 毫米。花期 11 月至翌年 3 月。

产于广西。生于海拔 960—1200 米山坡林下或溪边阴湿地。模式标本采自广西金秀。

本种全草入药, 治跌打或蛇伤。

28. 长茎金耳环(植物分类学报) 金耳环(广西南宁), 一块瓦(广西东兴)

Asarum longerhizomatosum C. F. Liang et C. S. Yang in Act. Phytotax. Sin. 13(2): 21. pl. 1, f. 2 et pl. 2, f. 4—10. 1975; 中国高等植物图鉴补编 1: 248. 图 8503. 1982.

多年生草本; 根状茎细长, 节间长 6—12 厘米; 根通常纤细, 稀稍肉质而较粗壮。叶 1—2 片, 叶片长方状卵形或卵状椭圆形, 长 8—14 厘米, 宽 5—8 厘米, 先端渐尖, 基部耳形或近戟形, 两侧裂片略成三角形, 顶端圆形, 长 3—3.5 厘米, 宽 2—2.5 厘米, 叶面具散生短毛, 脉和近边缘较密, 叶背无毛; 叶柄长 10—18 厘米, 无毛; 芽苞叶通常窄卵形, 长 10—15 毫米, 宽约 5 毫米, 两面无毛, 近边缘有睫毛。每花枝常具一花, 淡紫绿色, 直径约 3 厘米; 花梗长约 1.5 厘米; 花被管圆筒状, 长约 1.5 厘米, 直径约 1 厘米, 喉部缢缩, 膜环宽约 2 毫米, 内壁有纵行脊皱, 花被裂片宽卵形, 长宽各约 1.5 厘米, 顶部和边缘淡紫绿色, 中部紫色, 近喉部有乳突皱褶区; 药隔伸出, 舌状; 子房半下位, 花柱 6, 顶端 2 裂, 柱头侧生。花期 7—12 月。

产于广西。生于海拔 200 米林间空地, 或岩边阴湿地。模式标本采自上林大明山。

本种全草入药。

29. 五岭细辛(植物分类学报) 山慈菇(广东、湖南), 倒插花(贵州)

Asarum wulingense C. F. Liang in Act. Phytotax. Sin. 13(2): 22. pl. 5, 1—6. 1975; 中国高等植物图鉴补编 1: 248, 图 8504. 1982.

多年生草本; 根状茎短, 根丛生, 稍肉质而较粗壮, 直径 2.5—3 毫米。叶片长卵形或卵状椭圆形, 稀三角状卵形, 长 7—17 厘米, 宽 5—9 厘米, 先端急尖至短渐尖, 基部耳形或

耳状心形,两侧裂片长2—5厘米,宽1.5—4厘米,叶面绿色,偶有白色云斑,无毛,或侧脉和近叶缘处被短毛,叶背密被棕黄色柔毛;叶柄长7—18厘米,被短柔毛;芽苞叶卵形,长约12毫米,宽约8毫米,上面无毛,下面有毛,边缘密生睫毛。花绿紫色;花梗长约2厘米,常向下弯垂,被黄色柔毛;花被管圆筒状,长约2.5厘米,直径约1.2厘米,基部常稍窄缩,外面被黄色柔毛,喉部缢缩或稍缢缩,膜环宽约1毫米,内壁有纵行脊皱;花被裂片三角状卵形,长宽各约1.5厘米,基部有乳突皱褶区;药隔伸出,舌状;子房下位,花柱离生,顶端2叉分裂,柱头侧生。花期12月至翌年4月。

产于江西、湖南、广东、广西、贵州。生于海拔1100米林下阴湿地。模式标本采自广西龙胜。

本种全草入药。

组5. 长花组——Sect. *Longiflora* C. Y. Cheng et C. S. Yang in Journ. Arn. Arb.

64: 593. 1983.

花被管长管状或漏斗状,喉部无膜环或乳突偶排列成膜环状,内壁仅在基部具疏离的纵行脊皱;花被裂片基部的乳突向下直达管内。

本组我国有2种和1变种。

30. 祁阳细辛 山慈菇 (广东),南细辛(江西)图版45: 6—10

Asarum magnificum Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang in Journ. Arn. Arb.

64: 593, f. 11. 1983; ——*A. magnificum* Tsiang in Fl. Hup ch. 1: 208 f. 208. 1976, nom. illegit. ——*Heterotropa magnifica* (Tsiang) Mackawa in Journ. Jap. Bot. 57(9): 262. 1982, nom. illegit.

30a. 祁阳细辛(原变种)

Asarum magnificum Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang var. **magnificum**

多年生草本;根状茎极短,根丛生,稍肉质,直径2—4毫米。叶片近革质,三角状阔卵形或卵状椭圆形,长6—13厘米,宽5—12厘米,先端急尖,基部心状耳形,两侧裂片长2—5厘米,宽2.5—6厘米,外展,叶面中脉被短毛,两侧有白色云斑,叶背无毛,网脉不明显;叶柄长6—16厘米;芽苞叶卵形,长约15毫米,宽约7毫米,边缘密生睫毛。花绿紫色;花梗长约1.5厘米;花被管漏斗状,长3—5厘米,直径1.5厘米,喉部不缢缩,花被裂片三角状卵形,长约3厘米,宽2.5—3厘米,顶端及边缘紫绿色,中部以下紫色,基部有三角形乳突区,乳突扁平,向下延伸至管部成疏离的纵列,至花被管基部呈纵行脊状皱褶;药隔锥尖;子房下位,花柱离生,顶端2裂,柱头侧生。花期3—5月。

产于浙江、江西、湖北、陕西南部、湖南及广东北部。生于海拔300—700米林下阴湿处。模式标本采自湖南祁阳。

本种全草入药。