

耳状心形, 两侧裂片长 2—5 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 叶面绿色, 偶有白色云斑, 无毛, 或侧脉和近叶缘处被短毛, 叶背密被棕黄色柔毛; 叶柄长 7—18 厘米, 被短柔毛; 芽苞叶卵形, 长约 12 毫米, 宽约 8 毫米, 上面无毛, 下面有毛, 边缘密生睫毛。花绿紫色; 花梗长约 2 厘米, 常向下弯垂, 被黄色柔毛; 花被管圆筒状, 长约 2.5 厘米, 直径约 1.2 厘米, 基部常稍窄缩, 外面被黄色柔毛, 喉部缢缩或稍缢缩, 膜环宽约 1 毫米, 内壁有纵行脊皱; 花被裂片三角状卵形, 长宽各约 1.5 厘米, 基部有乳突皱褶区; 药隔伸出, 舌状; 子房下位, 花柱离生, 顶端 2 叉分裂, 柱头侧生。花期 12 月至翌年 4 月。

产于江西、湖南、广东、广西、贵州。生于海拔 1100 米林下阴湿地。模式标本采自广西龙胜。

本种全草入药。

组 5. 长花组——Sect. *Longiflora* C. Y. Cheng et C. S. Yang in Journ. Arn. Arb. 64: 593. 1983.

花被管长管状或漏斗状, 喉部无膜环或乳突偶排列成膜环状, 内壁仅在基部具疏离的纵行脊皱; 花被裂片基部的乳突向下直达管内。

本组我国有 2 种和 1 变种。

30. 祁阳细辛 山慈菇 (广东), 南细辛 (江西) 图版 45: 6—10

*Asarum magnificum* Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang in Journ. Arn. Arb. 64: 593, f. 11. 1983; ——*A. magnificum* Tsiang in Fl. Hup ch. 1: 208 f. 208. 1976, nom. illegit. ——*Heterotropa magnifica* (Tsiang) Mackawa in Journ. Jap. Bot. 57(9): 262. 1982, nom. illegit.


30a. 祁阳细辛 (原变种)

*Asarum magnificum* Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang var. *magnificum*

多年生草本; 根状茎极短, 根丛生, 稍肉质, 直径 2—4 毫米。叶片近革质, 三角状阔卵形或卵状椭圆形, 长 6—13 厘米, 宽 5—12 厘米, 先端急尖, 基部心状耳形, 两侧裂片长 2—5 厘米, 宽 2.5—6 厘米, 外展, 叶面中脉被短毛, 两侧有白色云斑, 叶背无毛, 网脉不明显; 叶柄长 6—16 厘米; 芽苞叶卵形, 长约 15 毫米, 宽约 7 毫米, 边缘密生睫毛。花绿紫色; 花梗长约 1.5 厘米; 花被管漏斗状, 长 3—5 厘米, 直径 1.5 厘米, 喉部不缢缩, 花被裂片三角状卵形, 长约 3 厘米, 宽 2.5—3 厘米, 顶端及边缘紫绿色, 中部以下紫色, 基部有三角形乳突区, 乳突扁平, 向下延伸至管部成疏离的纵列, 至花被管基部呈纵行脊状皱褶; 药隔锥尖; 子房下位, 花柱离生, 顶端 2 裂, 柱头侧生。花期 3—5 月。

产于浙江、江西、湖北、陕西南部、湖南及广东北部。生于海拔 300—700 米林下阴湿处。模式标本采自湖南祁阳。

本种全草入药。



1—5. 红金耳环 *Asarum petelotii* O. C. Schmidt: 1. 植株; 2. 花被内面; 3. 雄蕊; 4. 花柱及柱头; 5. 芽苞叶。6—10. 祁阳细辛 *A. magnificum* Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang: 6. 植株, 7. 花被内面; 8. 雄蕊; 9. 花柱及柱头; 10. 芽苞叶。11—13. 颍湖细辛 *A. magnificum* var. *dianguense* C. Y. Cheng et C. S. Yang: 11. 花; 12. 雄蕊; 13. 花柱及柱头。(宗维城绘)。