

本种和红金耳环 *A. petelotii* O. C. Schmidt 近似,但本种根状茎甚短;叶片三角状阔卵形,或卵状椭圆形,先端急尖,叶面有白色云斑;花被管直立不弯曲,喉部不缢缩而不同。

30b. 鼎湖细辛(变种) 山慈菇(广东阳江) 图版 45: 11—13

Asarum magnificum Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang var. *dinghuense* C. Y. Cheng et C. S. Yang in Journ. Arn. Arb. **64**: 596. f. 12. 1983.

本变种与原变种区别是花被管较短小,长约 1 厘米,直径约 8 毫米,乳突细而稀疏;叶片通常椭圆状卵形,叶面无云斑,疏被短毛,叶背在放大镜下可见颗粒状油点可区别。

产于广东(肇庆、阳江、信宜)。生于海拔 300—700 米灌木丛下阴湿处。模式采用肇庆。

本变种全草入药。

31. 红金耳环(中国高等植物图鉴) 图版 45: 1—5

Asarum petelotii O. C. Schmidt in Notizbl. Bot. Gart. Berl. **11**: 100. 1931; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 244, 图 8498. 1982.

多年生草本,植株粗壮;根状茎横走,长达 20 厘米以上,直径约 4 毫米,节间长达 8 厘米,丛生多数细根。叶大,叶片长卵形、三角状卵形或窄卵形,长 13—21 厘米,宽 6.5—13 厘米,先端长渐尖或渐尖,基部耳形或近戟形,两侧裂片通常外展,长可达 7 厘米,宽达 6 厘米,叶面无毛,叶背初沿脉有毛,后逐渐脱落,网脉明显;叶柄长 8—23 厘米;芽苞叶卵状披针形,长约 16 毫米,宽约 5 毫米,边缘密生睫毛。花绿紫色,直径约 4 厘米,花梗长 3—5 厘米;花被管长管状,长 3—5 厘米,直径 1.5—2 厘米,中部以上稍缢缩再向外扩展,常向一侧弯曲,花被裂片宽卵形,长约 2 厘米,宽约 2.5 厘米,顶端及边缘紫绿色,中部有半圆形紫色部分,其下为多列扁平乳突,乳突下延至管内成疏离的纵列,至管的基部呈脊状皱褶;药隔伸出,短舌状;子房近下位,花柱 6,先端 2 叉状,柱头卵形,侧生。花期 2—5 月。

产于云南南部。生于海拔 1100—1700 米林下阴湿地。越南也有分布。模式标本采自越南。

本种全草入药。

存 疑 种

一、下列 3 种产于我国台湾省,因未见标本,故暂略。

1. 白斑细辛(台湾植物志)

Asarum albomaculatum Hayata, Ic. Pl. Formos **5**: 139. f. 51. 1915.

模式标本采自台湾中部阿里山。

2. 芋叶细辛(台湾植物志)

Asarum hayatanum Maekawa in Journ. Jap. Bot **12**: 35. 1936.

模式标本采自台湾阿里山。