

状不同而变异较大,通常上部宽 5—10 厘米,向下渐狭,最下部宽仅 1—2 厘米,有时上部与下部近等宽,宽 2—6 厘米,顶端短尖至渐尖,中部以下渐狭,基部狭心形,两侧裂片下垂或稍内弯,湾缺深 3—5 毫米,宽 2—3 毫米,边全缘或上部每边有 1—3 个微波状圆裂齿,或有时仅一边有齿另一边全缘,下面密被微柔毛,沿叶脉上被倒生长柔毛,以后毛渐脱落;叶脉两面均明显,下面凸起,侧脉每边 7—12 条,横出或斜出,近边缘彼此连接,网脉明显凸起;叶柄长 1—2 厘米,常弯扭,密被棕色长柔毛。花单生或 2 朵聚生,有时排成总状花序,生于叶腋或老茎;花梗纤细,长 3—4 厘米,常向下弯垂,疏被长柔毛;小苞片着生于花梗近基部,钻形,极小,密被长柔毛;花初呈粉红色,以后暗褐色,花被管中部急遽弯曲,下部长 2—3 厘米,直径 3—5 毫米,弯曲处至檐部与下部近等长但稍狭,常有 $1/3$ 与下部贴生,具纵脉纹,外面被棕色长柔毛,内面近基部密被细柔毛,其余无毛;檐部扩展呈盘状,正圆形,直径 1.5—3 厘米,边缘浅 3 裂,裂片平展,阔卵形,近等大;花药长圆形,长达 3 毫米,成对贴生于合蕊柱上,并与其裂片对生;子房圆柱形,长约 1 厘米,6 棱;合蕊柱顶端 3 裂,裂片顶端尖,边缘向下延伸,具乳头状突起。蒴果长圆状,长约 4 厘米,成熟时 6 瓣开裂;种子卵形,长约 3 毫米,宽约 2 毫米,背面平凸状,腹面凹入,中间具海绵质种脊,灰褐色。花期 5—9 月,果期 10—12 月。

产于海南岛(万宁、琼中、琼海、保亭、崖县等)。生于海拔 200—600 米、阳光充足、土壤比较干燥的疏林中。模式标本采自保亭。

块根供药用,有抗菌、消炎、解毒之效;治高热、肺炎和喉痛等。

4. 大叶马兜铃(中国植物图鉴) 南木香(云南),金狮藤(广东),地黄蒲(台湾),香里藤、金腰带(福建),痢药草(台湾)

Aristolochia kaempferi Willd. Sp. Pl. 4(1):152. 1805; Duchartre in A. DC. Prodr. 15(1):439. 1864; Franch. et Savat. Enum. Pl. Jap. 1: 419. 1875; Hance in Lond. on Journ. Bot. 16:233. 1878; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:362. 1891; O. C. Schmidt in Engl. u. Plantl. Nat. Pflanzenfam. ed. 2. 16b:237. 1935; 黄淑美,植物分类学报 19: 229. 1981. — *A. mollis* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 364. 1908; Odashima in Journ. Soc. Trop. Agr. 7: 79. 1935. — *A. shimadai* Hayata Ic. Pl. Formos. 6:36. 1916, et Gen. Ind. Fl. Formos. 61. 1917, et List. Pl. Formos. 1666. 1928; Kudo et Masam. in Ann. Taihoku Bot. Gard. 2:47. 1932; T. S. Liu et M. J. Lai in Fl. Taiwan 2:576. 1976.

4a. 大叶马兜铃(原变型)

Aristolochia kaempferi Willd. f. *kaempferi*

草质藤本;根圆柱形,外皮黄褐色,揉之有芳香,味苦;嫩枝细长,密被倒生长柔毛,毛渐脱落,老枝无毛,明显具纵槽纹。叶纸质,叶形各式,卵形、卵状心形、卵状披针形或戟状耳形,长 5—18 厘米,下部宽 4—8 厘米,中部宽 2—5 厘米,顶端短尖或渐尖,基部浅心形