

疗胃痛、胸腹胀痛、风湿关节炎，外用治疗毒，湿疹、疥癣等。

28. 福建马兜铃(广西植物) 一条根、小号山东瓜、浦梨(福建)

*Aristolochia fujianensis* S. M. Hwang in *Guihaia* 3(2): 81—82. 1983.

草质藤本；根细长，长圆柱形，黄褐色；茎长50—100厘米，绿色而稍带紫色，有棱，密被白色或褐色长柔毛。叶厚纸质，心形或卵状心形，位于茎下部的叶较大，长与宽均4—11厘米，顶端短尖，基部心形，湾缺深1—1.2厘米，两侧裂片宽圆形，长1—2厘米，宽2—4厘米，边全缘，两面均被白色或褐色长柔毛，下面被毛较密；基出脉5—7条，延伸至上部常多分枝而互相连接，最末级网脉树枝状分枝，互相连接，密布油点；叶柄纤细，长2—8厘米，密被褐色或白色长柔毛；总状花序有花3—4朵或有时1朵生于叶腋，花序梗和花序轴极短，花梗长5—15毫米，近基部具小苞片；小苞片卵形或卵状心形，长5—10毫米，宽5—7毫米，下面密被白色长柔毛；花被长达3厘米，基部膨大呈球形，直径约4毫米，向上急速收狭成一长管，管口扩大呈漏斗状，外面密被白色长柔毛，绿色而具紫色纵条纹；檐部一侧极短，另一侧向上延伸成舌片；舌片卵状披针形，长8—16毫米，顶端延伸成长1—1.5厘米而弯扭的尾尖，暗紫色，具纵脉纹；花药卵形，贴生于合蕊柱近基部，并单个与其裂片对生；子房圆柱形，6棱；合蕊柱顶端6裂。蒴果长圆形或倒长卵形，长约2厘米，直径约1厘米，成熟时暗褐色，被褐色或白色长柔毛；果梗纤细，下垂；种子卵状三角形，褐色，长宽均约3毫米，背面平凸状，密布小点，腹面凹入，中间具种脊。花期3—4月，果期5—8月。

产于福建(宁德)、浙江(龙泉)。生于山地路边灌丛中。模式标本采自福建宁德。

29. 弄岗马兜铃(新拟) 弄岗通城虎(广西植物)

*Aristolochia longgonensis* C. F. Liang in *Guihaia* 2(3): 143. f. 1. 1982.

草质藤本，茎长4—5米，6棱，无毛。叶纸质或膜质，卵状心形、心形或近圆形，长8—13厘米，宽9—12厘米，顶端急渐尖，基部心形，两侧裂片近圆形，长2—3厘米，稍扩展或下垂，上面绿色，无毛，下面浅绿色，密被细短柔毛，密布油点；基出脉7条，网脉较稀疏，各级叶脉均在下面明显凸起；叶柄柔弱，长2—8厘米，无毛。总状花序常1—2个聚生于叶腋，有花2—6朵；花梗长1—2厘米，基部有小苞片；小苞片卵形，长5—7毫米，宽约3毫米，无柄，上面被短柔毛，下面无毛；花被全长约4.5厘米，基部膨大呈球形，直径约4毫米，向上渐收狭成一长管，管长约1厘米，近管口渐扩大成漏斗状；檐部一侧极短，有时稍2裂，另一侧向上延伸成舌片；舌片三角状披针形，顶端长渐尖，并延伸成长1—3厘米线形而弯扭的尾尖，浅褐紫色，有纵脉纹和横脉，口部具圆形黑紫斑，外面无毛，内面被短柔毛；花药卵形，贴生于合蕊柱近基部，并单个与其裂片对生；子房圆柱形，长约5毫米，无毛，6棱；合蕊柱顶端6裂，裂片三角形，顶端尖而稍弯，边缘向下延伸形成波状圆环，稍覆盖雄蕊。蒴果长圆形，长约7厘米，宽约2.5厘米，顶端圆而具凸尖，6棱，成熟时褐色，由基部向上6瓣开裂；果梗下垂，长约3厘米，常随果开裂成6条；种子卵状心形，褐