

针形，长约2毫米，顶端渐尖，内面3椭圆形，枝短，顶端圆钝，雄蕊8，花丝基部扩展。瘦果长椭圆形，长约2毫米，具3锐棱，平滑，有光泽，包于宿存花被内。花期6—8月，果期7—9月。

产西藏（札达）。生山坡砂砾地，海拔3500米。分布于高加索、哈萨克斯坦、伊朗、阿富汗、巴基斯坦至喜马拉雅山区西部。

2. 圆叶蓼

Polygonum intramongolicum A. J. Li in Fl. Intramongolica 2: 57. t. 35. f. 14. 1978; Borod. in Pl. Asiae Centr. 9: 102. 1989. — *P. tortuosum* (A. Los.) Lovel. в Бот. Журн. 60: 12. 1975, non D. Don 1825. — *Atraphaxis tortuosa* A. Los. in Bull. Jard. Bot. Prin. URSS 26(1): 6. 1927.

小灌木，高40—50厘米，树皮灰褐色，开裂，多分枝，枝弯曲，小枝密被小突起。叶圆形或宽椭圆形，长1—1.5厘米，宽1—1.3厘米，近革质，顶端圆钝，基部宽楔形或近圆形，边缘皱波状，上面绿色，沿中脉具小突起，侧脉不明显，下面灰绿色，中脉凸出，侧脉明显，沿叶脉具小突起，两面密被洼点；叶柄短，基部具关节；托叶鞘膜质，偏斜，顶端尖，褐色。花序总状，顶生，稀疏，长3—5厘米；苞片漏斗状，膜质，褐色，每1苞片内具2—3花；花梗长3—4毫米，中部具关节；花被5深裂，淡红色或白色，花被片倒卵形，顶端圆钝，长约4毫米，背部具绿色脉纹；雄蕊8，比花被短，花丝基部扩展；花柱3，中下部合生，柱头头状。瘦果宽卵形，具3锐棱，长3.5—4毫米，黑褐色，密被颗粒状小点，微有光泽，包于宿存花被内。花期5—6月，果期6—7月。

产内蒙古（乌兰察布盟，巴彦淖尔盟）。生于旱山坡、低山丘陵，海拔1000—2300米。蒙古南部（汗博格多 Хан-Богд）也有。模式标本采自内蒙古乌拉特旗。

3. 新疆蓼

Polygonum schischkinii Ivan. ex Borod. in Pl. Asiae Centr. 9: 104. 1989. — *P. glareosum* Schischk. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS 7: 121. 1937, non Phil. 1895.

半灌木，直立，自基部分枝，高20—40厘米，枝无毛，具纵棱，稍呈之字形弯曲，叶椭圆形或长圆形，长0.8—1.5厘米，宽3—6毫米，顶端尖或圆钝，基部楔形，边缘外卷，革质，灰绿色，两面无毛，下面中脉稍突出，叶柄长1—2毫米，具关节；托叶鞘基部草质，褐色，中上部膜质，白色，2裂。花序总状，长4—7厘米；苞片绿色，每苞内具1—2花；花梗长约1.5毫米；花被5深裂，花被片长卵形，背部绿色，边缘淡红色或白色，长2—2.5毫米；雄蕊8，花丝不相等，其中3个基部较宽；花柱3，柱头头状。瘦果长卵形，具3棱，长3—3.5毫米，黑褐色，有光泽，包于宿存花被内。花期6—7月，果期7—8月。

产新疆西北部。生砂砾质荒漠、盐碱地，海拔600—1500米。模式标本采自新疆额尔齐斯河左岸、契列塔斯丘陵地。