

本种广为栽培，变异很大，被分为若干亚种、变种和变型。我国现在栽培的品种也很多，引种来源很杂，但常见的有4个栽培类型，我们均按变种对待。

1. 厚皮菜 着茎菜(本草纲目)、猪乸菜(广州)、海白菜(陕西)

Beta vulgaris L. var. cicla L.

根不肥大，有分枝。我国南方栽培较多。叶供蔬菜用。

2. 糖萝卜 甜菜

Beta vulgaris L. var. saccharifera Alef.

根纺锤形，肥厚，白色，富含糖分。我国各省区均有栽培，但以北方栽培面积最大。根供制糖，叶可作蔬菜用或作猪的青饲料。

3. 紫菜头 紫萝卜(北京)、红菜头

Beta vulgaris L. var. rosea Moq.

根纺锤形至近球形，肥厚，紫红色；叶脉紫红色。北京一带栽培较多。根供蔬菜用。

4. 饲用甜菜

Beta vulgaris L. var. lutea DC.

根肥大，浅澄黄色。甘肃、内蒙古一带栽培较多。根供饲料用。

iii 盐角草族——*Salicornieae Dum.*

花两性兼有雌性；苞片肉质，先端盾形，排列紧密，花生于苞片腋部，多少嵌入肉质的花序轴内。

3. 盐角草属* —— *Salicornia L.*

L. Sp. Pl. 3, 1753, p.p.; idem Gen. Pl. ed. 5, 4, 1754, p.p.

草本或小灌木。茎直立或外倾，光滑，枝对生，肉质，多汁，有关节。叶不发育，对生，鳞片状。花序为圆柱形的穗状花序，有柄，生于枝条的上部；花两性，无柄，陷入肉质的花序轴内；无小苞片；花被合生，顶端有4—5小齿，上部近扁平，成菱形，果时为海绵质；雄蕊1—2；花柱极短，有2个钻状的柱头。果实为胞果，包藏于花被内；种子直立，两侧扁；胚半环形，无胚乳。

本属约30种，分布于亚洲、欧洲、非洲及美洲。我国有1种。

* 中名异名：盐角属(中国北部植物图志)、海蓬子属(种子植物名称)。