

毫米,互生,花较小,每3朵花聚生在一起,花与花之间的基部稍连合;雄蕊2,比花被长;子房卵形,两侧扁;柱头2,钻状;果皮膜质;种子圆形,直径0.5—1毫米,种皮黄褐色,密生乳头状小突起。花果期7—9月。

产我国新疆。生于盐湖边。苏联中亚地区及高加索地区也有。

5. 盐爪爪属——*Kalidium* Moq.

Moq. in DC. Prodr. 13(2): 146. 1849.

小灌木,多分枝,无关节。叶互生,叶片圆柱状或不发育,肉质,基部下延。花序穗状,有柄;花两性,基部嵌入肉质的花序轴内,每3朵花极少为1朵花生于1苞片内;苞片肉质,螺旋状排列,无小苞片;花被合生几至顶部,在顶部形成1个小孔,在小孔的周围有4—5个小齿,果时成海绵状;雄蕊2;子房卵形;柱头2,有乳头状突起。果实为胞果,包藏于花被内;种子直立,两侧扁,种皮近革质;胚半环形,有胚乳。

本属有5种,分布于欧洲东南部、亚洲西北部。我国有5种1变种。

分 种 检 索 表

1. 叶片长4—10毫米;穗状花序直径3—4毫米(黑龙江、内蒙古、河北、甘肃、宁夏、青海、新疆)……1. 盐爪爪 *K. foliatum* (Pall.) Moq.
1. 叶片长不超过3毫米或不发育;穗状花序直径1.5—3毫米。
 2. 小枝粗壮;每1苞片内有3朵花。
 3. 叶片发育,长1.5—3毫米,卵状,顶端急尖,稍内弯(内蒙古、河北、陕西、甘肃、宁夏、新疆)……2. 尖叶盐爪爪 *K. cuspidatum* (Ung.-Sternb.) Grub.
 3. 叶片不发育,瘤状,长约1毫米,顶端钝。
 4. 植株高10—25厘米,自基部分枝;小枝上的叶片倒圆锥状(新疆)……3. 圆叶盐爪爪 *K. schrenkianum* Bunge ex Ung.-Sternb.
 4. 植株高20—70厘米,通常自中部分枝;小枝上的叶片鞘状(新疆)……4. 里海盐爪爪 *K. caspicum* (L.) Ung.-Sternb.
 2. 小枝细弱;每1苞片内有1朵花(内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)……5. 细枝盐爪爪 *K. gracile* Fenzl

1. 盐爪爪 (灰碱柴) 图版 2: 1—4

Kalidium foliatum (Pall.) Moq. in DC. Prodr. 13(2): 147. 1849. Iljin in Fl. URSS 6: 166. t. 63. f. 1 a-d. 1936; 东北草本植物志 2: 69. t. 63. 1959; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 64. 1966; 中国高等植物图鉴 1: 590. f. 1179. 1972. — *Salicornia foliata* Pall. Reise 1: 422. 1771. et app. 482. — *Kalidium*