

foliatum (Pall.) Moq. var. *longifolium* Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 3(2):771. 1851; 东北草本植物志 2: 69. t. 64. 1959. syn. nov.

小灌木，高 20—50 厘米。茎直立或平卧，多分枝；枝灰褐色，小枝上部近于草质，黄绿色。叶片圆柱状，伸展或稍弯，灰绿色，长 4—10 毫米，宽 2—3 毫米，顶端钝，基部下延，半抱茎。花序穗状，无柄，长 8—15 毫米，直径 3—4 毫米，每 3 朵花生于 1 鳞状苞片内；花被合生，上部扁平成盾状，盾片宽五角形，周围有狭窄的翅状边缘；雄蕊 2；种子直立，近圆形，直径约 1 毫米，密生乳头状小突起。花果期 7—8 月。

产黑龙江、内蒙古、河北北部、甘肃北部、宁夏、青海、新疆。生于盐碱滩、盐湖边。蒙古、苏联西伯利亚及中亚地区、欧洲东南部也有。

2. 尖叶盐爪爪

Kalidium cuspidatum (Ung.-Sternb.) Grub. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 19: 103. 1959 et in Pl. Asiae Centr. 2: 62. t. 5. f. 1. 1966. — *K. arabicum* (L.) Moq. var. *cuspidatum* Ung.-Sternb Versuch Syst. Salicorn. 93. 1866.

尖叶盐爪爪(原变种) 图版 3:1—2

Kalidium cuspidatum (Ung.-Sternb.) Grub. var. *cuspidatum*

小灌木，高 20—40 厘米。茎自基部分枝，枝近于直立，灰褐色，小枝黄绿色。叶片卵形，长 1.5—3 毫米，宽 1—1.5 毫米，顶端急尖，稍内弯，基部半抱茎，下延。花序穗状，生于枝条的上部，长 5—15 毫米，直径 2—3 毫米；花排列紧密，每 1 苞片内有 3 朵花；花被合生，上部扁平成盾状，盾片成长五角形，具狭窄的翅状边缘。胞果近圆形，果皮膜质；种子近圆形，淡红褐色，直径约 1 毫米，有乳头状小突起。花果期 7—9 月。

产河北、内蒙古、宁夏、陕西、甘肃、新疆。生于盐湖边及盐碱滩地。蒙古也有。

黄毛头(变种) 图版 3:3

Kalidium cuspidatum (Ung.-Sternb.) Grub. var. *sinicum* A. J. Li in 植物分类学报 16:117. 1978.

本变种与原变种的区别是：枝条密集；叶片较小，长 1—1.5 毫米。

产甘肃、宁夏、青海。生于丘陵、山坡、洪积扇边缘。

3. 圆叶盐爪爪 图版 3:4—5

Kalidium schrenkianum Bunge ex Ung.-Sternb. Versuch Syst. Salicorn. 95. 1866; Iljin in Fl. URSS 6: 168. 1936; Голоск. in Фл. Казахст. 3: 246. t. 26. f. 3. 1960; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2:65. t. 5. f. 3. 1966;