

也有。

6 盐节木属* —— *Halocnemum* Bieb

Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 3: 3. 1819.

半灌木。多分枝，小枝对生，有关节。叶不发育，叶片成鳞片状，对生。花序穗状，无柄；花两性，腋生，每3朵花极少为2朵花生于1苞片内，苞片为盾状的鳞片，对生，无小苞片；花被3深裂，花被片宽卵形，顶端钝；雄蕊1；子房卵形，两侧扁；柱头2，钻状，有乳头状小突起；胚珠倒生。果实为胞果；种子直立；胚半环形，有胚乳。

本属为单种属，分布于欧洲南部、亚洲西部及北部、非洲北部。

1. 盐节木 图版 1: 3

Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 3: 3. 1819; Iljin in Fl. URSS 6: 171. t. 8 f. 4 a—d. 1936; Голоск. in Фл. Казахст. 3: 248. t. 26. f. 6. 1960; Grubov, Fl. Asiae Centr. 2: 67. 1966. —— *Salicornia strobilacea* Pall. Reise 1: 412, 431. 1771.

半灌木，高20—40厘米。茎自基部分枝；小枝对生，近直立，有关节，平滑，灰绿色，老枝近互生，木质，平卧或上升，灰褐色，枝上有对生的，缩短成芽状的短枝。叶对生，连合。花序穗状，长0.5—1.5厘米，直径2—3毫米，无柄，生于枝的上部，交互对生，每3朵花极少为2朵花生于1苞片内；花被片宽卵形，两侧的两片向内弯曲，花被的外形成倒三角形；雄蕊1。种子卵形或圆形，直径0.5—0.75毫米，褐色，密生小突起。花果期8—10月。

产新疆、甘肃北部。生盐湖边、盐土湿地。苏联、蒙古、阿富汗、伊朗及非洲北部也有。

7. 盐穗木属** —— *Halostachys* C. A. Mey.


C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St.

Pétersb. 1: 361. 1843.

灌木。茎直立，分枝；枝对生，开展，小枝肉质，有关节，密生小突起。叶不发育，鳞片状，对生。花序穗状，有柄，对生；花两性，腋生，每3花生于1苞片内；苞片鳞片状，

* 中名异名：盐节草属(中国植物科属检索表)。

** 中名异名：盐穗草属(中国植物科属检索表)。



图版 1 1. 盐角草 *Salicornia europaea* L.; 2. 盐干屈菜 *Halopeplis pygmaea* (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb.; 3. 盐节木 *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) Bieb.; 4. 盐穗木 *Halostachys caspica* (Bieb.) C. A. Mey.