

对生,无小苞片;花被合生,顶端3浅裂,花被裂片内折;雄蕊1;子房卵形,两侧扁;柱头2,钻状,有乳头状小突起。果实为胞果;种子直立,卵形,两侧扁;胚半环形,有胚乳。

本属为单种属,分布于欧洲东南部、亚洲西部。

1. 盐穗木 图版 1: 4

Halostachys caspica (Bieb.) C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St. Pétersb. 1: 361 1843; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 66. 1966. — *Halocnemum caspicum* Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 3: 3. 1819. — *Halostachys caspica* (Pall.) C. A. Mey. nom. illegit. Iljin in Fl. URSS 6: 169. 1936. — *H. belangeriana* (Moq.) Botsch. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Kom. Acad. Sci. URSS 16: 84. 1954; Голоск. in Фл. Казахст. 3: 247. t. 26. f. 5. 1960.

灌木,高50—200厘米。茎直立,多分枝;老枝通常无叶,小枝肉质,蓝绿色,有关节,密生小突起。叶鳞片状,对生,顶端尖,基部联合。花序穗状,交互对生,圆柱形,长1.5—3厘米,直径2—3毫米,花序柄有关节;花被倒卵形,顶部3浅裂,裂片内折;子房卵形;柱头2,钻状,有小突起。胞果卵形,果皮膜质;种子卵形或矩圆状卵形,直径6—7毫米,红褐色,近平滑。花果期7—9月。

产新疆、甘肃北部。生于盐碱滩、河谷、盐湖边。苏联、伊朗、阿富汗、蒙古也有。


iv. 滨藜族——Atriplicaceae C. A. Mey

花单性;雌花无花被或有花被;子房或雌花着生于通常特化的苞片内;植物体有糠秕状被覆物或分枝状、星状毛。

8. 小果滨藜属——*Microgynoecium* Hook f.

Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl 3: 56. 1880.

一年生草本,稍有囊状毛(粉粒)。叶互生,扁平,卵形,具叶柄,全缘或具浅裂片。花极小,单性,雌雄同株,无小苞片。雄花花被近膜质,5裂;雄蕊1—4,花丝丝状,花药不具附属物。雌花簇生于具3个裂片而两个侧裂片内折的叶状苞片的腋部,无柄,通常仅1—3个发育;花被退化,残留5个细小的丝状裂片;子房椭圆形,背腹扁;柱头2,毛发状;花柱极短;胚珠无柄。胞果斜卵形,臃胀,背腹稍扁,表面有少数鸡冠状突起;果皮薄,贴伏于种子。种子直立,种皮硬壳质,黑色,具点纹;胚细瘦,马蹄形,胚乳粉质。



图版 1 1. 盐角草 *Salicornia europaea* L.; 2. 盐干屈菜 *Halopeplis pygmaea* (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb.; 3. 盐节木 *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) Bieb.; 4. 盐穗木 *Halostachys caspica* (Bieb.) C. A. Mey.