

*Corispermum platypterum* Kitag. in Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. 4, 2: 100. f. 12. 1935; idem Lineam. Fl. Manch. 189. 1939; 东北草本植物志 2: 83. 1959; Baranov in Journ. Jap. Bot. 44(6): 196. 1969.

植株高 30—50 厘米，茎绿色，圆柱状，直径 2—3 毫米，被稀疏的毛；分枝纤细，基部的分枝最长，上升，余者斜举，长 9—25 厘米。叶条形，长 3—6 厘米，宽 1—2 毫米，先端渐尖具小尖头，基部渐狭，全缘，1 脉。穗状花序顶生和侧生，圆柱状，纤细，疏松，下部疏离，上部花稍密；苞片由叶状过渡到卵状，下部苞片由叶状至披针形，长 3—1.5 厘米，宽 1—1.5 毫米，仅基部稍具白膜质边缘，明显地比果窄；中部以上的苞片由披针形（少数）至卵形（多数），全具膜缘，比果稍窄。花被片 1—3，近轴花被片卵圆形，长 1.5 毫米，顶圆形具不规则的细齿，基部近圆形，白膜质，远轴花被 2，小，三角状；雄蕊 3—5，花丝比花被片长 1.5 倍。果实近圆形，长 4—5 毫米，宽 3.5—4.5 毫米，顶端下陷呈锐角状缺刻，基部圆楔形或心脏形，背面凸起中央扁平，腹面扁平或凹入，无毛；果核椭圆形倒卵形，长约 3.5 毫米，宽约 2 毫米，顶端圆形，基部楔形；果喙长约 1.2 毫米，喙尖为喙长的 1/4；果翅宽约 1 毫米，薄，半透明，缘具不规则的细齿。花果期 7—9 月

我国特产。产吉林（延边、白城），辽宁西部、河北东北部。生于固定沙丘、海滨沙滩和沙质耕地。

模式标本采自辽宁〔马栏河、沙河口〕。

## 22. 细苞虫实

*Corispermum stenolepis* Kitag. in Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. 4, 2: 102. t. 13. 1935; idem Lineam. Fl. Manch. 190. 1939; 东北草本植物志 2: 82. 1959; Baranov in Journ. Jap. Bot. 44(6): 167. 1969; 中国高等植物图鉴 1: 589. f. 1177. 1972.

细苞虫实（原变种） 图版 12: 8

*Corispermum stenolepis* Kitag. var. *stenolepis*

茎直立，高 15—50 厘米，圆柱状，直径 1.5—2 毫米；分枝纤细，多集中于中上部，长 7—35 厘米，通常下部分枝较长。叶条形，极狭，长约 3.5 厘米，有时达 4.5 厘米，宽约 1 毫米，先端渐尖具小尖头，基部渐狭，全缘，1 脉。穗状花序顶生或侧生，纤细，具稀疏的花；苞片由条状披针形至披针形，先端渐尖具小尖头，长 0.6—3.5 厘米，宽 1—2 毫米，显著地比果狭。花被片 1，宽椭圆形，长 0.9—1.2 毫米，宽约 0.6 毫米；雄蕊 1—3，花丝比花被片长。果实近圆形，长 4.5—5.5 毫米，宽 3.9—5 毫米，顶端下陷呈深的