

丝不伸出花被,花药球形;柱头2,极短。胞果顶端露出于花被外,果皮膜质,黄白色。种子扁球形,直径0.75毫米,横生、斜生及直立,暗褐色或红褐色,边缘钝,表面有细点纹。花果期5—10月。

广布于南北半球的温带。根据现有标本和资料,我国除台湾、福建、江西、广东、广西、贵州、云南诸省区外,其它各地都有分布。生于农田、菜园、村房、水边等有轻度盐碱的土壤上。

7. 红叶藜 图版16: 9—11

Chenopodium rubrum L. Sp. Pl. 218. 1753; Iljin in Fl. URSS 6: 53. 1936; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 23. 1966. ———*Blitum polymorphum* C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. 1: 13. 1829 (p. p.). ———*B. rubrum* Reichenb. Fl. Germ. Excurs 852. 1832; Moq. in DC. Prodr. 13 (2): 83. 1849.

一年生草本,高30—80厘米。茎直立或斜升,平滑,淡绿色或带红色,具条棱但无明显的色条,通常上部有长2—8厘米的分枝。叶片卵形至菱状卵形,肉质,长4—8厘米,宽2—6厘米(分枝上的叶较小),两面均为浅绿色或有时带红色,下面稍有粉,先端渐尖,基部楔形,边缘锯齿状浅裂,有时不裂;裂齿3—5对,三角形,不等大,通常稍向上弯,先端微钝;叶柄长约为叶片长度的 $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{5}$ 。花两性兼有雌性,数个团集,于分枝上排列成穗状圆锥花序;花被裂片3—4,较少为5,倒卵形,绿色,腹面凹,背面中央稍肥厚,无粉或稍有粉,果时无变化;柱头2,极短。果皮膜质,带白色,不与种子贴生。种子稍扁,球形或宽卵形,直立、斜生及横生,红黑色至黑色,直径0.75—1毫米,边缘钝,表面具明显的矩圆形点纹。花果期8—10月。

产黑龙江西部、内蒙古、宁夏、甘肃北部至新疆。生于路旁、田边及轻度盐碱地。分布于北美、欧洲、小亚细亚至中亚。

组5. 合被藜组 Sect. *Degenia* Aellen

团伞花序中的侧生花雌性,花被倒卵形,2—4浅裂,肥厚;中心花两性,花被近球形,4—5深裂;种子在雌花中直立,在两性花中横生,胚环形;植物体稍有囊状毛(粉)。

8. 合被藜 图版16: 4—5

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen in Ostenia 98. 1933; Iljin in Fl. URSS 6: 50. 1936; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 19. 1966. ———*Blitum chenopodioides* L. Mant. 2: 170. 1771. ———*B. polymorphum* C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. 1: 18. 1829 (p. p.).



图版 16 1—3. 东亚市藜 *Chenopodium urticum* L. subsp. *sinicum* Kung et G. L. Chu 1. 枝; 2. 叶; 3. 花被及胞果。4—5. 合被藜 *C. chenopodioides* (L.) Aellen 4. 枝; 5. 花被。6—8. 球花藜 *C. foliosum* (Moench) Aschers. 6. 枝; 7. 叶; 8. 花被及胞果。9—11. 红叶藜 *C. rubrum* L. 9. 枝; 10—11. 花被及胞果。(蔡淑琴绘)