

花果期 8—10 月。

产宁夏、甘肃西部和西南部、四川西北部、青海(祁连山)、新疆。生于海拔 2000—4000 米之间的河谷阶地、山坡及较干旱的草地。苏联的中亚地区也有分布。

14. 市藜(中国北部植物图志)

*Chenopodium urbicum* L. Sp. Pl. 281. 1753; Moq. in DC. Prodr. 13 (2): 69. 1849; Koch. Syn. Fl. Germ. 532. 1857; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 3: 224. f. 544 g—l. 1912; Rechb. Ic. Fl. Germ. 24: t. 246. f. 1—6 et t. 247. f. 1—3. 1909; Iljin in Fl. URSS 6: 59. t. 3. f. 5. 1936.

市藜(原亚种)

*Chenopodium urbicum* L. subsp. *urbicum*

一年生草本,高 20—100 厘米,全株无粉,幼叶及花序轴有时稍有棉毛。茎直立,较粗壮,有条棱及色条,分枝或不分枝。叶片三角形,长 3—8 厘米,宽度与长度相等或较小,稍肥厚,先端急尖或渐尖,基部近截形或宽楔形,两面近同色,边缘具不整齐锯齿;叶柄长 2—4 厘米。花两性兼有雄蕊不发育的雌花,少数团集并形成以腋生为主的直立穗状圆锥花序;花被裂片 5,花药矩圆形,花丝稍短于花被。胞果双凸镜形,果皮黑褐色。种子横生,直径约 1 毫米,红褐色至黑色,有光泽,表面具不清晰的点纹,边缘钝。花期 8—9 月,果期 10 月。

产新疆北部。生于戈壁、田边等处。分布于欧洲。

东亚市藜(亚种) 图版 16: 1—3

*Chenopodium urbicum* L. subsp. *sinicum* Kung et G. L. Chu in 植物分类学报 16:121.1978.——*C. urbicum* auct. non L.; 中国北部植物图志 4: 57. t. 19. f. 1—5. 1935; 中国高等植物图鉴 1: 579. f. 1158. 1972.——*C. urbicum* L. var. *intermedium* auct. non Koch; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 188. 1939; 东北草本植物志 2: 96. 1959.——*C. urbicum* L. var. *integrum* auct. non Moq.; Blom in Act. Hort. Gothob. 86. 1930.

本亚种与原亚种的区别在于:花序以顶生穗状圆锥花序为主;花簇由多数花密集而成;花被裂片 3—5,狭倒卵形,花被基部狭细呈柄状;种子横生、斜生及直立,直径 0.5—0.7 毫米,边缘锐,表面点纹清晰。叶菱形至菱状卵形,茎下部叶的叶片长达 15 厘米,近基部的 1 对锯齿较大呈裂片状。花果期 7—10 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、江苏北部、山西、内蒙古、陕西北部、新疆准噶尔。生于荒地、盐碱地、田边等处。