

米；胚环形，胚乳块状，褐色。花果期7—10月。

产新疆、甘肃西部。生于戈壁滩。伊朗、阿富汗、苏联中亚地区也有分布。

4. 地肤(植物名实图考)

Kochia scoparia (L.) Schrad. in Neues Journ. 3: 85. 1809; Moq. in DC. Prodr. 13 (2): 130. 1849; Boiss. Fl. Orient. 4: 925. 1879; Franch. Pl. David. 1: 249. 1884; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 11. 1886; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 328. 1891; Bunge in Act. Hort. Petrop. 13: 20. 1893; Ulbr. in Engl. u. Prantl, Pflanzenfam. 2 Aufl. 16c: 535. 1934; 中国北部植物图志 4: 67—68. t. 24. f. 1—5. 1935; Iljin in Fl. URSS 6: 133. t. 5. f. 9. 1936; Ohwi, Fl. Jap. 477. 1956. ——*Chenopodium scoparia* L. Sp. Pl. 221. 1753. ——*Kochia virgata* Kostel. Ind. Sem. Hort. Prap. 77. 1844. ——*K. scoparia* (L.) Schrad. var. *alata* Blom in Act. Hort. Gothob. 3: 154. 1927.

地肤(原变种) 图版 21: 1—5

Kochia scoparia (L.) Schrad. var. *scoparia*

一年生草本，高50—100厘米。根略呈纺锤形。茎直立，圆柱状，淡绿色或带紫红色，有多数条棱，稍有短柔毛或下部几无毛；分枝稀疏，斜上。叶为平面叶，披针形或条状披针形，长2—5厘米，宽3—7毫米，无毛或稍有毛，先端短渐尖，基部渐狭入短柄，通常有3条明显的主脉，边缘有疏生的锈色绢状缘毛；茎上部叶较小，无柄，1脉。花两性或雌性，通常1—3个生于上部叶腋，构成疏穗状圆锥花序，花下有时有锈色长柔毛；花被近球形，淡绿色，花被裂片近三角形，无毛或先端稍有毛，翅端附属物三角形至倒卵形，有时近扇形，膜质，脉不很明显，边缘微波状或具缺刻；花丝丝状，花药淡黄色，柱头2，丝状，紫褐色，花柱极短。胞果扁球形，果皮膜质，与种子离生。种子卵形，黑褐色，长1.5—2毫米，稍有光泽；胚环形，胚乳块状。花期6—9月，果期7—10月。

全国各地均产。生于田边、路旁、荒地等处。分布于欧洲及亚洲。

幼苗可做蔬菜；果实称“地肤子”，为常用中药，能清湿热、利尿，治尿痛、尿急、小便不利及荨麻疹，外用治皮肤癣及阴囊湿疹。

碱地肤(东北草本植物志)(变种)

Kochia scoparia (L.) Schrad. var. *sieversiana* (Pall.) Ulbr. ex Aschers. et Graebn. Synops. 5: 163. 1913. ——*K. scoparia* var. *albovillosa*