

Kitag. in Rep. First Sc. Exped. Manch. Sect. 4, 4: 78. 1936.—*K. sieversiana* (Pall.) C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. 1: 415. 1829; 东北草本植物志 2: 89. 1959.—*Suaeda sieversiana* Pall. Illustr. 45. t. 38. 1803.

本变种与原变种的区别在于，花下有较密的束生锈色柔毛。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。生于山沟湿地、河滩、路边、海滨等处。

本种还有一个园艺栽培变型扫帚菜 *f. trichophylla* (Hort.) Schinz et Thell.—分枝繁多，植株呈卵形或倒卵形；叶较狭。栽培作扫帚用。晚秋枝叶变红，可供观赏。

5. 全翅地肤

Kochia krylovii Litv. in krylov, Fl. Alt. 5: 1121. 1909; Iljin in Fl. URSS 6: 132. t. 5. f. 16. 1936; Aellen in Mitt. Basler Bot. Ges. 2: 8. 1954; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 47. 1966.

一年生草本，高 10—20 厘米，全株除花被外均有密长柔毛。茎自基部起强烈分枝，呈密丛状；枝具条棱及绿色色条。叶圆柱状，长 3—15 毫米，宽 0.5—1 毫米，先端急尖或钝，基部渐狭。花两性，无柄，通常 1—3 个团集，遍布叶腋；花被近盘状，无毛，5 浅裂；翅状附属物膜质，倒卵形至条形，全缘，通常具紫红色脉；花丝稍伸出花被外，花药长 0.3—0.4 毫米；柱头 2，羽毛状，稍外弯，伸出于花被外，花柱极短。胞果宽卵形，长约 1.5 毫米，果皮膜质。种子黑褐色；胚环形，深绿色，胚乳坚实。花期 8 月，果期 9—10 月。

产新疆北部。生于河滩、荒地。苏联西西伯利亚、蒙古西部也有分布。

6. 毛花地肤

Kochia laniflora (S. G. Gmel.) Borb. Balaton Fl. 340. 1900; Iljin in Fl. URSS 6: 130. t. 5. f. 15. 1936; Aellen in Mitt. Basler Bot. Ges. 2: 8. 1954.—*Salsola laniflora* S. G. Gmel. Reise d. Russl. 1: 160. t. 37. 1774.—*Kochia arenaria* (Maerklin) Roth in Schrad. Journ. Bot. 2 (1): 304. 1801.—*Salsola arenaria* Maerklin in Schrift. Regensb. Bot. Ges. 1: 332. 1792.—*S. dasyantha* Pall. Illustr. 19. t. 11. 1803.

一年生草本，高 20—50 厘米。茎直立，具少数分枝或不分枝，常带紫红色，稍有棉毛，具微条棱，无色条；枝斜升，细瘦，茎基部的分枝近直立。叶互生，半圆柱状，长 5—15 毫米，宽 0.5—1 毫米，略有绢状长伏毛，先端渐尖，开展，直伸或稍内弯，近无