

圆柱状,膜质或肉质,密被毛。花两性,无柄,单生或构成穗状花序;无苞片和小苞片;花被筒状,膜质,被毛,上部5裂,裂齿等长,果时在花被背部具5个非翅状的附属物;雄蕊5;子房宽卵圆状,无柄,花柱短,柱头2—(3)。胞果卵圆形,顶基压扁;果皮膜质,不与种皮相联。种子横生,圆形;胚环形。

本属记载约10种,分布于旧大陆的温带地区和大洋洲。我国产3种,分布于北方各省和青藏高原。


分 种 检 索 表

1. 叶扁平,倒披针形或披针状条形,膜质;花序穗状,致密,多毛。果期花被背部附属物钩状(新疆、甘肃)……………3. 钩刺雾冰藜 *Bassia hyssopifolia* (Pall.) O. Kuntze
1. 叶半圆柱状或圆柱状,条形,肉质;花序不为穗状。果期花被背部附属物钻状或三角状。
 2. 枝开展,分枝与茎间夹角通常大于45°,密被水平生长的长柔毛。果期花被背部附属物钻状,劲直,平展,呈五角星状(黑龙江、吉林、辽宁、山东、河北、山西、陕西、甘肃、内蒙古、青海、新疆、西藏)……………1. 雾冰藜 *Bassia dasyphylla* (Fisch. et Mey.) O. Kuntze
 2. 枝帚状,分枝与茎间夹角通常小于45°,密被卷曲柔毛。果期花被背部附属物三角状,平展或稍向上弯(新疆北部)……………2. 肉叶雾冰藜 *Bassia sedoides* (Pall.) Aschers.

1. 雾冰藜(肯诺藜、星状刺果藜、雾冰草) 图版22: 1—3

Bassia dasyphylla (Fisch. et Mey.) O. Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 546. 1891; 东北草本植物志 2: 88. 1959; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 44. 1966.——*Kochia dasyphylla* Fisch. et Mey. in Schrenk Enum. Pl. 1: 12. 1841.——*Chenolea divaricata* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 10. 1890; 中国北部植物图志 4: 65—66. t. 23. 1935.——*Echinopsilon divaricatum* Kar. et Kir. in Bull. Sci. Nat. Mosc. 14: 736. 1841; Iljin in Fl. URSS 6: 126. t. 5. f. 7. 1936; Голоск. in Фл. Казахст. 3: 229. 1960; 中国高等植物图鉴 1: 586. f. 1172. 1972.

植株高3—50厘米,茎直立,密被水平伸展的长柔毛;分枝多,开展,与茎夹角通常大于45°,有的几成直角。叶互生,肉质,圆柱状或半圆柱状条形,密被长柔毛,长3—15毫米,宽1—1.5毫米,先端钝,基部渐狭。花两性,单生或两朵簇生,通常仅一花发育。花被筒密被长柔毛,裂齿不内弯,果时花被背部具5个钻状附属物,三棱状,平直,坚硬,形成一平展的五角星状;雄蕊5,花丝条形,伸出花被外;子房卵状,具短的花柱和2—(3)个长的柱头。果实卵圆状。种子近圆形,光滑。花果期7—9月。



图版 21 1—5. 地肤 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 1. 枝条; 2. 叶; 3. 种子; 4. 胚; 5. 带翅的花被。6—8. 黑翅地肤 *K. melanopectera* Bunge 6. 果枝; 7. 叶; 8. 带翅的花被。9—11. 木地肤 *K. prostrata* (L.) Schrad. 9. 植株; 10. 叶; 11. 花被。12—13. 灰毛木地肤(变种) *K. prostrata* (L.) Schrad. var. *canescens* Moq. 12. 枝; 13. 叶。14—15. 密毛木地肤(变种) *K. prostrata* (L.) Schrad. var. *villosissima* Bong. et Mey. 14. 枝; 15. 叶。16—18. 尖翅地肤 *K. odontoptera* Schrenk 16. 果枝; 17. 叶; 18. 带翅的花被。19—21. 伊朗地肤 *K. iranica* Litv. ex Bornm. 19. 果枝; 20. 叶; 21. 带翅的花被。(蔡淑琴绘)