

5. 叶条形，半圆柱状，长6—12毫米，密生乳头状突起(新疆).....
5. 粗糙假木贼 *A. pelliotii* Danguy
5. 叶鳞片状至钻状，平滑。
6. 花被片果时具翅状附属物(若在幼花时花被片背面可见略增厚的分生组织)；花盘裂片条形；叶鳞片状，先端无刺状尖。
 7. 当年枝不分枝，具5—8节间(新疆).....6. 白垩假木贼 *A. cretacea* Pall.
 7. 当年枝有分枝，具8—12节间(新疆).....7. 展枝假木贼 *A. truncata* (Schrenk) Bunge
6. 花被片果时不具翅状附属物；花盘裂片半圆形；叶钻状，先端有刺状尖(新疆).....
8. 毛足假木贼 *A. eriopoda* (Schrenk) Benth

1. 高枝假木贼 图版33: 13

Anabasis elatior (C. A. Mey.) Schischk. in Фл. Зап. Сиб. 4, 961. 1930;
 Iljin in Fl. URSS 6: 300. 1936; Грубов. Конс. Фл. МНР 123. 1955; Поляк.
 in Фл. Казахст. 3: 296. 1960; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 104. 1966.—
Brachylepis elatior C. A. Mey. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 8: 341.
 1840; Bong. et Mey. Verzeichn. Pfl. Saisangnor 221. t. 15. 1842.—
Anabasis phyllophora Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 14: 731.
 1841; Bunge, Anab. Rev. 41. 1862.—*A. korovini* Iljin in Fl. URSS. 6:
 300. 1936.

半灌木，高15—30厘米。木质茎多分枝，灰褐色至灰白色。当年枝直立或稍斜伸，具10—20节间，上部有短的斜伸分枝；节间圆柱状或上部的稍扁，通常长1—1.5厘米，直径1.5—3毫米。叶先端略钝，并具半透明的短刺状尖；中部及下部叶钻状，长约3毫米，开展或外弯；上部叶鳞片状，长约2毫米，贴伏于枝。花单生叶腋，在枝端和分枝上集成短的穗状花序；花被片膜质，下半部稍厚，外轮3片宽卵形，果时背面具发达的横翅，内轮2片较狭，果时无翅或有时具较狭的翅；翅肾形，黄白色或粉红色，通常直立；小苞片先端稍锐，无刺状尖；花盘裂片条形，顶端篦齿状；子房卵形，平滑；柱头外弯，内侧有小突起。胞果卵形至宽卵形，长2—3毫米，果皮肉质，黄褐色或粉红色。花果期7—10月。

产新疆北部。生于戈壁、盐土荒漠、阳山坡等处。蒙古及苏联西西伯利亚、哈萨克斯坦也有分布。

2. 短叶假木贼 图版33: 1

Anabasis brevifolia C. A. Mey. in Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. 1: 10.
 t. 39. 1829 et in Ledeb. Fl. Alt. 1: 377. 1829; Bunge, Anab. Rev. 42. 1862;

Iljin in Fl. URSS 6: 287. t. 15. f. 8—9. 1936; Губов, Консп. Фл. МНР 123. 1955; Поляк. in Фл. Казахст. 3: 291. 1960, Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 103. t. 3. f. 2. 1966. — *A. affinis* Fisch. et Mey. in Enum. Pl. Nov. Soong. 1: 10. 1841. — *A. abolinii* Iljin in Fl. URSS 6: 878. 287. 1936.


半灌木，高 5—20 厘米。根粗壮，黑褐色。木质茎极多分枝，灰褐色；小枝灰白色，通常具环状裂隙；当年枝黄绿色，大多成对发自小枝顶端，通常具 4—8 节间，不分枝或上部有少数分枝；节间平滑或有乳头状突起，下部的节间近圆柱形，长可达 2.5 厘米，上部的节间渐短并有棱。叶条形，半圆柱状，长 3—8 毫米，开展并向右弧曲，先端钝或急尖并有半透明的短刺尖；近基部的叶通常较短，宽三角形，贴伏于枝。花单生叶腋（有时叶腋内同时具有含 2—4 花的短枝而类似簇生）；小苞片卵形，腹面凹，先端稍肥厚，边缘膜质；花被片卵形，长约 2.5 毫米，先端稍钝，果时背面具翅，翅膜质，杏黄色或紫红色，较少为暗褐色，直立或稍开展，外轮 3 个花被片的翅肾形或近圆形，内轮 2 个花被片的翅较小，圆形或倒卵形；花盘裂片半圆形，稍肥厚，带橙黄色；花药长 0.6—0.9 毫米，先端急尖；子房表面通常有乳头状小突起；柱头黑褐色，直立或稍外弯，内侧有小突起。胞果卵形至宽卵形，长约 2 毫米，黄褐色。种子暗褐色，近圆形，直径约 1.5 毫米。花期 7—8 月，果期 9—10 月。

产内蒙古西部、宁夏、甘肃西部及新疆。生于戈壁、冲积扇、干旱山坡等处。蒙古及苏联西西伯利亚、哈萨克斯坦也有分布。

一些著作中承认 *A. affinis* Fisch. et Mey. 为一独立种，提出与本种的差异点主要是，前者每叶腋含 1—6 花，枝及叶有乳头状突起，而本种的花是单生叶腋，枝叶无乳头状突起。我们研究这些差异点时，看到叶腋内含数个花的标本，其中每个花除了具 2 小苞片之外，还各有 1 个短叶，这证明花仍然是单生的，只不过是一个短枝而已。至于枝叶有无乳头状突起，也是很不固定的，往往在两者间交替出现。据此，我们认为 *A. affinis* 应并入本种。

3. 无叶假木贼 图版 33: 2—5

Anabasis aphylla L. Sp. Pl. 223. 1753; Bunge, Anab. Rev. 40. 1862; Boiss. Fl. Orient. 4: 969. 1879; Iljin. in Fl. URSS 6: 297. 1936; Губов, Консп. Фл. МНР 122. 1955; Поляк. in Фл. Казахст. 3: 295. т. 28. ф. 5. 1960; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 103. 1966; 中国高等植物图鉴 1: 600. f. 1200. 1972. — *A. tatarica* Pall. Illustr. 13. т. 8. 1803.



图版 33 1. 短叶假木贼 *Anabasis brevifolia* C. A. Mey. 枝。2—5. 无叶假木贼 *A. aphylla* L. 2. 枝；3. 花被及翅状附属物；4. 子房；5. 花盘。6. 白垩假木贼 *A. cretacea* Pall. 植株。7. 展枝假木贼 *A. truncata* (Schrenk) Bunge 植株。8. 毛足假木贼 *A. criopoda* (Schrenk) Benth. 枝的一部分。9—10. 盐生假木贼 *A. salsa* (C. A. Mey.) Benth. 9. 枝；10. 花。11—12. 粗糙假木贼 *A. pelliottii* Danguy 11. 枝的一部分；12. 花盘。13. 高枝假木贼 *A. elatior* (C. A. Mey.) Schischk. 枝。(冀朝桢绘)