

半灌木，高20—50厘米。木质茎多分枝，小枝灰白色，通常具环状裂隙；当年枝鲜绿色，分枝或不分枝，直立或斜上，节间多数，圆柱状，长0.5—1.5厘米。叶不明显或略呈鳞片状，宽三角形，先端钝或急尖。花1—3朵生于叶腋，多于枝端集成穗状花序；小苞片短于花被，边缘膜质；外轮3个花被片近圆形，果时背面下方生横翅；翅膜质，扇形、圆形、或肾形，淡黄色或粉红色，直立；内轮2个花被片椭圆形，无翅或具较小的翅；花盘裂片条形，顶端篦齿状。胞果直立，近球形，直径1.5—2毫米，果皮肉质，暗红色，平滑。花期8—9月，果期10月。

产甘肃西部、新疆。生于山前砾石洪积扇、戈壁、沙丘间，有时也见于干旱山坡。分布于欧洲、中亚及苏联西西伯利亚。

本种的当年生枝含生物碱，其中主要为毒藜碱（anabasine $C_{10}H_{14}N_2$ ），有杀虫作用，可供制土农药。此外，本种也有固沙作用。


4. 盐生假木贼 图版33：9—10

Anabasis salsa (C. A. Mey.) Benth. ex Volkens in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3. 1a: 87. 1893; Iljin in Act. Hort. Petrop. 43: 227. 1930 et in Fl. URSS 6: 288. 1936; Бочанцев in Фл. Узбек. 3: 301. 1953; Грубов, Консп. Фл. МНР 123. 1955; Поляк. in Фл. Казахст. 3: 291. т. 28. ф. 1. 1960; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 106. 1966. — *Brachylepis salsa* C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. 1: 372. 1829 et in Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. 1: 12. т. 48. 1829; Bunge, Anab. Rev. 48. 1862. — *Anabasis ramosissima* Minkw. in Bull. Jard. Bot. 14 (3): 232. 1914.

半灌木，高10—20厘米。木质茎多分枝，灰褐色至灰白色；当年枝多数，直立或斜升，上部分枝，具5—10节间，节间圆柱状或稍有棱，通常长0.6—2厘米，平滑。下部及中部叶条形，半圆柱状，长2—5毫米，开展并向外弧曲，先端具易脱落的半透明短刺状尖，上部叶鳞片状，三角形，先端稍钝，无刺状尖。花单生叶腋，于枝端集成短穗状花序；小苞片背面肥厚，边缘膜质；花被片长1.5—2毫米，外轮3片近圆形，内轮2片宽卵形，先端钝，果时无变化，背面不生翅状附属物；花盘裂片不显著或略呈半圆形；子房卵形，平滑，柱头黑褐色。胞果宽卵形，果皮肉质，黄褐色或稍带红色，顶端露于花被外。

产新疆北部。生于戈壁、盐碱荒漠等处。蒙古及苏联（高加索、哈萨克斯坦、西西伯利亚）也有分布。

牧草，骆驼秋冬喜食。



图版 33 1. 短叶假木贼 *Anabasis brevifolia* C. A. Mey. 枝。2—5. 无叶假木贼 *A. aphylla* L. 2. 枝；3. 花被及翅状附属物；4. 子房；5. 花盘。6. 白垩假木贼 *A. cretacea* Pall. 植株。7. 展枝假木贼 *A. truncata* (Schrenk) Bunge 植株。8. 毛足假木贼 *A. criopoda* (Schrenk) Benth. 枝的一部分。9—10. 盐生假木贼 *A. salsa* (C. A. Mey.) Benth. 9. 枝；10. 花。11—12. 粗糙假木贼 *A. pelliottii* Danguy 11. 枝的一部分；12. 花盘。13. 高枝假木贼 *A. elatior* (C. A. Mey.) Schischk. 枝。(冀朝桢绘)