

5. 粗糙假木贼 图版 33: 11

Anabasis pelliottii Danguy in Not. Syst. 2 (6): 146. 1912; Iljin in Fl. URSS 6: 285. t. 15. f. 10. 1936; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 105. t. 7. f. 8. 1966.

茎基密生柔毛。当年枝多条，发白茎基，铺散或斜升，有分枝，通常具4—8节间，有乳头状突起；节间略呈四棱形，通常长1—3厘米，易断落。叶条形，半圆柱状，长6—12毫米，宽1—2毫米，稍向下弧曲，上面平或具浅槽，先端稍肥大并具半透明的短刺状尖。花通常1—3朵生于叶腋；小苞片短于花被；花被片宽椭圆形，长约2.5毫米，边缘全缘或啮蚀状，果时稍增大，背面下方具半月形翅突；雄蕊5，花丝狭纺锤状，稍扁，花药矩圆形，先端有细尖；花盘裂片半圆形；子房卵形或圆锥形，有颗粒状小突起；柱头钻状，黑褐色，花柱不明显。花果期8—10月。

产新疆西南部。生于干山坡。帕米尔和苏联乌兹别克斯坦也有分布。

6. 白垩假木贼 图版 33: 6


Anabasis cretacea Pall. Reise 1: 442. 493. 1771 et Illustr. 15. t. 9. 1803; Bunge, Anab. Rev. 36. 1862; Iljin Fl. URSS 6: 295. 1936; Поляк. in Фл. Казахст. 3: 294. t. 28. f. 3. 1960. — *A. tianschanica* Botsch. in Not. Syst. Inst. Bot. et Zool. Acad. Sci. Uzbek. 11: 5. 1948. syn. nov. — *A. truncata* auct. non Bunge; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 107. 1966. p. p.

植物体高5—15厘米，茎基褐色至暗褐色，有密绒毛。根粗壮，直径达3厘米。当年枝多条，发白茎基，黄绿色，直立，不分枝，通常具5—8节间；节间近圆柱状，直径2—3毫米，平滑，有时具伤疤状斑痕。叶鳞片状，圆柱形，长1—2毫米，边缘膜质，先端钝，无刺状尖。花单生叶腋，小苞片卵状矩圆形，先端稍锐；花被片外轮3片宽椭圆形，内轮2片较狭，果时通常仅外轮3片具翅；翅膜质，肾形或近圆形，粉红色（干后淡黄色）；花盘裂片条形，顶端钝齿状；子房平滑，柱头通常外弯。胞果暗红色或澄黄色，长2—2.5毫米。花果期8—10月。

产新疆北部。生于戈壁、盐碱土荒漠、干山坡等处。分布于欧洲、中亚、苏联西伯利亚。

7. 展枝假木贼 图版 33: 7

Anabasis truncata (Schrenk) Bunge, Anab. Rev. 38. 1862; Iljin in Fl. URSS 6: 296. t. 15. f. 4a—b. 1936; Грубов, Консп. Фл. МНР 123.



图版 33 1. 短叶假木贼 *Anabasis brevifolia* C. A. Mey. 枝。2—5. 无叶假木贼 *A. aphylla* L. 2. 枝；3. 花被及翅状附属物；4. 子房；5. 花盘。6. 白垩假木贼 *A. cretacea* Pall. 植株。7. 展枝假木贼 *A. truncata* (Schrenk) Bunge 植株。8. 毛足假木贼 *A. eriopoda* (Schrenk) Benth. 枝的一支。9—10. 盐生假木贼 *A. salsa* (C. A. Mey.) Benth. 9. 枝；10. 花。11—12. 粗茎假木贼 *A. pelliottii* Danguy 11. 枝的一段；12. 花盘。13. 高枝假木贼 *A. elatior* (C. A. Mey.) Schischk. 枝。(冀朝棣绘)