

1955; Поляк. in Фл. Казахст. 3: 294. t. 38. f. 4. 1960; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 107. 1966 (p. p.).—*Brachylepis truncata* Schrenk in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St. Pétersb. 2: 193. 1844.

植物体高10—20厘米，茎基褐色至暗褐色，有密绒毛。根粗壮，圆柱状，直径达3厘米。当年枝多条，发自茎基，直立，平滑，具8—12节间，上部有分枝；枝对生，平展或先端向下弯曲，长2—3厘米；节间圆柱状，直径2—3毫米，有时具伤疤状斑痕。叶鳞片状，半圆形，先端钝或急尖，无刺状尖，长1—2毫米，边缘稍膜质。花单生叶腋，于枝端和分枝上排成短穗状花序；小苞片边缘膜质；花被片外轮3片宽椭圆形至矩圆形，果时具翅，内轮2片较狭，无翅或有短的翅状突起；翅宽椭圆形至近圆形，稍开展；花盘裂片条形，顶端近截平；子房横的宽椭圆形，平滑；花柱短而直，黑色。胞果形状与子房同，果皮肉质，黄褐色，直径2.5—3毫米。花果期8—10月。


产新疆。生于戈壁、干山坡。分布于中亚及苏联西西伯利亚。

8. 毛足假木贼 图版 33: 8

Anabasis eriopoda (Schrenk) Benth. ex Volkens in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3. 1a: 87. 1893; Iljin in Fl. URSS 6: 290. t. 15. f. 1. 1936; Грубов, Консп. Фл. МНР 123. 1955; Поляк. in Фл. Казахст. 3: 293. 1960; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 105. 1966.—*Brachylepis eriopoda* Schrenk in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St. Pétersb. 1: 360. 1843; Bunge, Anab. Rev. 49, 1862; Boiss. Fl. Orient. 4: 971. 1879.

植物体通常呈半球形，高15—30厘米。茎基密生白色长柔毛；当年枝多条，发自茎基，蓝绿色，平滑，稍有白色蜡粉，直立或外倾，具10—15节间，上部有斜升的分枝；节间四棱形，仅最下部的节间略呈圆柱状，长5—30毫米，干后常有小凸起。叶钻状或三角状，平展或稍下弯，长2—5毫米，先端具刺状尖；刺状尖半透明，长2—5毫米，直伸或向外弯曲。花两性，单生叶腋；小苞片稍短于花被，背面肥厚，绿色，边缘膜质，先端有刺状尖；花被片长2—3毫米，先端急尖或钝，外轮3片宽椭圆形，内轮2片狭卵形，果时不生翅状附属物；花盘裂片半圆形，稍肥厚；柱头黄绿色。胞果宽卵形或近球形，背腹略扁，长3—4毫米，果皮肉质，黄色或橙黄色，上部露出花被外。花果期6—8月。

产新疆北部。生于荒漠、戈壁、干山坡。蒙古、苏联哈萨克斯坦也有分布。



图版 33 1. 短叶假木贼 *Anabasis brevifolia* C. A. Mey. 枝。2—5. 无叶假木贼 *A. aphylla* L. 2. 枝；3. 花被及翅状附属物；4. 子房；5. 花盘。6. 白垩假木贼 *A. cretacea* Pall. 植株。7. 展枝假木贼 *A. truncata* (Schrenk) Bunge 植株。8. 毛足假木贼 *A. eriopoda* (Schrenk) Benth. 枝的一段。9—10. 盐生假木贼 *A. salsa* (C. A. Mey.) Benth. 9. 枝；10. 花。11—12. 粗梢假木贼 *A. pelliottii* Danguy 11. 枝的一段；12. 花盘。13. 高枝假木贼 *A. elatior* (C. A. Mey.) Schischk. 枝。(冀朝禎绘)