

5 深裂,圆锥状;花被片披针形,果时白背面的近顶部横生膜质的翅;雄蕊 5 或 2;花药矩圆形,无附属物;子房卵形,两侧扁;花柱短;柱头 2,丝状。果实为胞果,果皮膜质,与种子附贴,包藏于花被内;种子直立或横生,圆形,种皮膜质或近革质;胚螺旋状,无胚乳。

本属有 3 种,分布于亚洲西部及中部、欧洲南部及非洲北部。我国有 2 种, 1 变种。

分 种 检 索 表

1. 植株幼时有蛛丝状毛;雄蕊 5;种子横生(山西、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、青海、新疆)……………2. 白茎盐生草 *H. arachnoideus* Moq.
1. 植株无蛛丝状毛;雄蕊通常为 2;种子直立。
 2. 茎、枝无乳头状小突起(甘肃、青海、新疆及西藏)……………1. 盐生草 *H. glomeratus* (Bieb.) C. A. Mey.
 2. 茎、枝密生乳头状小突起(青海、新疆、西藏)……………1a. 西藏盐生草 *H. glomeratus* (Bieb.) C. A. Mey. var. *tibeticus* (Bunge) Grub.

1. 盐生草

Halogeton glomeratus (Bieb.) C. A. Mey. in Ledeb. Icon. Pl. Fl. Ross. 1: 10. t. 40. 1829 et in Fl. Alt. 1: 378. 1829; Hand. -Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 79: 38. 1930; Iljin in Fl. URSS 6: 351. t. 14. f2. a—c. 1936; Поляк. in Фл. Казахст. 3: 318. 1960; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 116. 1966. — *Anabasis glomerata* Bieb. in Mem. Soc. Nat. Mosc. 1: 110. 1806.

盐生草(原变种) 图版 34: 1—3

Halogeton glomeratus (Bieb.) C. A. Mey. var. *glomeratus*

一年生草本,高 5—30 厘米。茎直立,多分枝,枝互生,基部的枝近于对生,无毛,无乳头状小突起,灰绿色。叶互生,叶片圆柱形,长 4—12 毫米,宽 1.5—2 毫米,顶端有长刺毛,有时长刺毛脱落;花腋生,通常 4—6 朵聚集成团伞花序,遍布于植株;花被片披针形,膜质,背面有 1 条粗脉,果时白背面近顶部生翅,翅半圆形,膜质,大小近相等,有多数明显的脉,有时翅不发育而花被增厚成革质;雄蕊通常为 2;种子直立,圆形。花果期 7—9 月。

产甘肃西部、青海、新疆及西藏。生于山脚,戈壁滩。蒙古、苏联西伯利亚和中亚地区亦有。