

产新疆北部。生于戈壁滩、盐湖边。苏联中亚地区也有。

17. 费尔干猪毛菜 图版 38: 15—17

Salsola ferganica Drob. in Trav. Mus. Bot. Acad. Sci. Pétersb. 16: 141. 1916.——*Climacoptera ferganica* (Drob.) Botsch. in Собрн. работ, посвящ. акад. Сукачеву 112. 1956; Поляк. in Фл. Казахст. 3: 277. 1960; Grubov, Pl. Asiae Centr. 2: 97. t. 4. 1966.

一年生草本，高10—30厘米；茎自基部分枝，分枝多而密集，植株外形成球状，茎、枝密生短柔毛并混生卷曲的长毛，长毛以后脱落。叶片半圆柱状，伸展，灰绿色，长1—1.5厘米，宽1—2毫米，顶端钝，基部下延，密生短柔毛并混生卷曲的长毛，有时长毛脱落。花序穗状；苞片长卵形，顶端钝，密生短柔毛，比小苞片长；小苞片卵形，与花被近等长；花被片披针形，有短柔毛，果时自背面中下部生翅；翅膜质，紫红色或深褐色，有多数细而密生的脉，3个较大，为半圆形，2个较窄狭，花被果时（包括翅）直径10—15毫米；花被片在翅以上部分披针形，顶端渐尖，有短柔毛，向中央聚集成圆锥体；花药附属物泡状，极小，长为花药的 $1/8$ — $1/10$ ；柱头钻状，长为花柱的3—4倍。种子横生。花期7—8月，果期8—9月。

产新疆北部。生于盐碱荒地，砂质荒漠。苏联中亚地区也有。


18. 长柱猪毛菜 图版 38: 6—8

Salsola sukaczewii (Botsch.) A. J. Li, comb. nov.——*Climacoptera sukaczewii* Botsch. in Собрн. работ, посвящ. акад. Сукачеву 112. t. 1. 1956.

一年生草本，高15—30厘米；植株灰绿色，多分枝，外形为球状，密生短柔毛，幼时有卷曲的长毛，老时长毛通常脱落。叶片半圆柱状，长1—2厘米，宽1.5—2毫米，顶端钝，基部下延。花序穗状，花排列稀疏；苞片宽披针形，顶端钝；小苞片长卵形，顶端尖，与花被等长或略短；花被片披针形，膜质，密生短柔毛，果时变硬，自背面的中下部生翅；翅3个较大，半圆形，近薄膜质，淡紫红色或黄褐色，有多数细而密集的脉，2个较小，条形，花被果时（包括翅）直径15—18毫米；花被片在翅以上部分，狭披针形，密生短柔毛，向中央聚集成细长的圆锥体；花药顶端有泡状附属物；附属物椭圆形，有短柄，紫红色干后为白色，与花药近等长或略短。柱头钻状，长为花柱的6—8倍；花柱极短；种子横生。花期7—8月，果期9—10月。

产新疆北部。生于沙丘，沙地。苏联中亚地区亦有分布。

本种与费尔干猪毛菜 (*Salsola ferganica* Drob.) 相近，但后者花药附属物极小，长为花药的 $1/8$ — $1/10$ ，可以区别。



图版 38 1—5. 短柱猪毛菜 *Salsola lanata* Pall. 1. 植株一部分; 2. 枝条一部分; 3. 果时的花被; 4. 雌蕊(示柱头); 5. 花药(示附属物)。6—8. 长柱猪毛菜 *S. sukaczewii* (Botsch.) A. J. Li 6. 植株一部分; 7. 果时的花被; 8. 雌蕊(示柱头)。9—11. 粗枝猪毛菜 *S. subcrassa* M. Pop. 9. 植株一部分; 10. 果时的花被; 11. 雌蕊(示柱头)。12—14. 褐翅猪毛菜 *S. korshinskyi* Drob. 12. 植株一部分; 13. 果时的花被; 14. 雌蕊(示柱头)。15—17. 费尔干猪毛菜 *S. ferganica* Drob. 15. 植株一部分; 16. 果时的花被; 17. 雌蕊(示柱头)。18—20. 钝叶猪毛菜 *S. heptapotamica* Iljin 18. 植株一部分; 19. 果时的花被; 20. 雌蕊(示柱头)。(王金凤绘)