

米，粗 1.2 厘米，顶端渐尖，基部连合，脊缘有齿。花单生，黄色或紫色，直径 6—10 厘米；花梗长 2.5 厘米；雄蕊 8，黄色，退化雄蕊多数；柱头 10—16，羽毛状。果实大，肉质，可食。

原产非洲南部。我国栽培供观赏。

5. 美丽日中花（华北经济植物志要） 松叶菊（植物学大辞典），龙须海棠（北京植物志），美繁花（经济植物手册） 图版 7：4

Mesembryanthemum spectabile Haw., *Observ. Mesembr.* 385. 1795; 北京植物志上册 242. 图 185. 1962; 中国高等植物图鉴 1: 616. 图 1231. 1972. — *Lampranthus spectabilis* (Haw.) N. E. Br. in *Gard. Chron. ser. 3.* 87; 71 (in clavi), 212. 1930.

多年生常绿草本，高 30 厘米。茎丛生，斜升，基部木质，多分枝。叶对生，叶片肉质，三棱线形，长 3—6 厘米，宽 3—4 毫米，具凸尖头，基部抱茎，粉绿色，有多数小点。花单生枝端，直径 4—7.5 厘米；苞片叶状，对生；花萼 5 深裂，裂片不等大；花瓣多数，紫红色至白色，线形，长 2—3 厘米，基部稍连合；雄蕊多数，基部合生；子房下位，5 室；花柱无，柱头 5，线形。蒴果肉质，星状 5 瓣裂；种子多数。花期春季或夏秋。

原产非洲南部。我国栽培供观赏。

7. 番杏属* *Tetragonia* L.

L., *Sp. Pl.* 480. 1753 et *Gen. Pl.* 215. 1754; Benth. et Hook. f., *Gen. Pl.* 1: 854. 1867; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* 2. Aufl. 16c: 231. 1934.

肉质草本或半灌木，无毛、有毛或具白亮小颗粒状凸起（针晶体）。茎直立、斜升或平卧。叶互生，扁平，全缘或浅波状，无托叶。花两性，小形，花梗有或无，单生或数个簇生叶腋，绿色或淡黄绿色；花被 3—5 裂，常有角，花被筒和子房贴生；雄蕊 4 或更多，着生花被筒上，与花被裂片互生，单生或成束；子房下位，3—8 室，每室具 1 粒下垂胚珠，花柱线形，与室同数。果实坚果状，陀螺形或倒卵球形，顶部常凸起或具小角；种子近肾形，胚弯曲。

50—60 种，分布非洲、亚洲东部、澳大利亚、新西兰、温带南美。我国有 1 种。

属模式种：T. fruticosa L.

本属有时独立成 Tetragoniaceae。

1. 番杏（质问本草） 法国菠菜、新西兰菠菜 图版 7：5—7

* 番杏属（植物学大辞典）。



图版 7 1—3. 冰叶日中花 *Mesembryanthemum crystallinum* L. : 1. 植株; 2. 花; 3. 果实。4. 美丽日中花 *M. spectabile* Haw. : 花枝。5—7. 番杏 *Tetragonia tetragonioides* (Pall.) Kuntze : 5. 植株一部分; 6. 花; 7. 果实。(钱存源绘)