

全草药用，有止痢杀菌之效，治肠炎、腹泻、内痔出血等症。

5. 沙生马齿苋（中草药）

Portulaca psammotropa Hance in Walp. Ann. Bot. Syst. 2: 660. 1851—2; v. Poellnitz in Fedde, Repert. Sp. Nov. 37: 315. 1934. — *P. hainanensis* Chun et How in Act. Phytotax. Sin. 7(1): 8. pl. 2: 2. 1958, syn. nov.; 海南植物志 1: 385. 1964. — *P. pachyrrhiza* auct., non Gagnep.; Merr. et Chun in Suynyatsenia 2: 222. 1935.

多年生、铺散草本，高 5—10 厘米。根肉质，粗 4—8 毫米。茎肉质，直径 1—1.5 毫米，基部分枝。叶互生，叶片扁平，稍肉质，倒卵形或线状匙形，长 5—10 毫米，宽 2—4 毫米，顶端钝，基部渐狭成一扁平、淡黄色的短柄，干时有白色小点，叶腋有长柔毛。花小，无梗，黄色或淡黄色，单个顶生，围以 4—6 片轮生叶；萼片 2，卵状三角形，长约 2.5 毫米，具纤细脉；花瓣椭圆形，与萼片等长；雄蕊 25—30；子房宽卵形，中部以上有一凸起环纹，花柱顶部扩大呈漏斗状，5 裂。蒴果宽卵形，扁压，长 3.5—4 毫米，宽约 3 毫米，下半部灰色，上部稻秆黄色，有光泽；种子多数，黑色，圆肾形。花果期夏季。

产海南崖县和东沙岛。生于海边沙地。

6. 小琉球马齿苋（台湾植物志）

Portulaca insularis Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 22: 229. 1932; 台湾植物志 2: 316. 1976.

铺散、上升草本。茎肉质，多分枝，无毛，叶腋有疏柔毛。叶互生，叶片倒卵状圆形或椭圆状倒卵形，长 3—7 毫米，宽 1—3 毫米，顶端钝，基部渐狭。单花顶生或腋生，无梗，基部具密柔毛；萼片 2，长圆状三角形，长约 3 毫米，膜质；花瓣 5，红色，近楔形至长圆形，顶端多少微凹，长 4 毫米；雄蕊 10；花柱丝状，上端三叉。蒴果近球形，直径 2.5 毫米；种子细小。

产我国台湾琉球屿（小琉球岛）。

本种未见标本，仅据《台湾植物志》记载于此。

2. 土人参属* *Talinum* Adans.

Adans., Fam. Pl. 2: 145. 1763; Juss., Gen. Pl. 312. 1789; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 1: 157. 1862; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 248. 1934; v. Poellnitz in Fedde, Repert. Sp. Nov. 35: 2. 1934.

* 土人参属（中国植物科属检索表）。