

2. 治疝草属* *Herniaria* L.

L., Sp. Pl. 218. 1753 et Gen. Pl. 130. 1754.

多年生草本，稀一年生。茎铺散或俯卧，多分枝。叶对生，叶片长圆状椭圆形或近圆形，无柄；托叶小形，膜质，早落。花两性，小形，绿色，近无梗或有短梗，单生或成聚伞花序；苞片膜质；萼片5，顶端无芒尖；花瓣缺；雄蕊5，稀4；子房卵圆形，由2心皮合生，1室，具1至多粒胚珠；花柱极短，基部连合，顶端2裂。果实为瘦果；种子卵圆形或扁圆形，两面凸起，黑色，具光泽。

约35种，分布于欧洲、地中海经亚洲西部至阿富汗和非洲南部。我国有3种，产新疆，其中1种间断出现于四川。

属模式种：治疝草 *H. glabra* L.

分种检索表

1. 萼片、雄蕊均为4数，萼片全部被毛 2. 杂性治疝草 *H. polygama* J. Gay
 1. 萼片、雄蕊均为5数，萼片无毛或仅边缘具毛。
 2. 萼片无毛 1. 治疝草 *H. glabra* L.
 2. 萼片边缘具缘毛 3. 高加索治疝草 *H. caucasica* Rupr.

1. 治疝草（中国高等植物图鉴补编） 光治疝草（中国种子植物分类学），脱肠草（拉汉种子植物名称） 图版11：1—5

Herniaria glabra L., Sp. Pl. 218. 1753; Muravjeva in Kom. Fl. USSR. 6: 567. tab. 34. fig. 5. 1936; 中国高等植物图鉴补编1: 290. 图8541. 1982.


多年生草本，全株鲜黄绿色，无毛或被疏柔毛。茎基部多分枝，铺散，长5—18厘米。叶片长圆状椭圆形或倒卵形，长3—7毫米，宽1—3毫米，顶端圆钝，基部楔形，两面无毛。聚伞花序腋生；苞片卵形，膜质，具缘毛；萼片卵状长圆形，长约1.5毫米，宽0.5毫米，无毛，顶端圆钝，外面无毛，边缘被缘毛；雄蕊5，花丝短，花药长圆形；柱头乳头状。瘦果卵圆形，长约2毫米；种子1粒，扁圆形，直径约0.5毫米，褐色，具光泽。花期7月，果期8—9月。

产新疆（北部）、四川（西部）。生于海拔900—2400米的草甸、山坡阳处及沼泽地带。欧洲至中亚地区、蒙古也有。模式标本采自欧洲。

2. 杂性治疝草（新拟） 杂性脱肠草（拉汉种子植物名称） 图版11：6—9

Herniaria polygama J. Gay in Duch. Rev. Bot. 2: 371. 1847; Muravjeva in Kom.

* 治疝草属（中国种子植物分类学）；脱肠草属（拉汉种子植物名称）。



图版 11 1—5. 治疝草 *Herniaria glabra* L. : 1. 植株; 2, 3. 茎的一段 (放大); 4. 花; 5. 果实。6—9. 杂性治疝草 *H. polygama* J. Gay; 6. 花枝; 7. 茎的一段 (放大); 8. 花; 9. 果实。10—13. 高加索治疝草 *H. caucasica* Rupr. : 10. 花枝; 11. 茎的一段 (放大); 12. 花; 13. 果实。(钱存源绘)