

Fl. USSR 6: 571. tab. 34. fig. 4. 1936.

多年生草本，高3—15厘米，全株被短柔毛。茎铺散，稍直立。叶片长圆状椭圆形，长3—10毫米，宽1—3毫米，顶端钝，基部渐狭，两面被短柔毛；叶柄极短；托叶宽卵圆形，白色，膜质，具缘毛。聚伞花序腋生；萼片4，披针形，长1.5毫米，宽0.5毫米，顶端急尖，外面被毛；雄蕊4，短于萼片，花药长圆形；花柱外露，柱头2裂，长约0.5毫米。瘦果卵形，通常与宿存萼近等长；种子未见。花期7—8月，果期8—9月。

产新疆。生于海拔550米草原地带。罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯也有。

3. 高加索治疝草（新拟） 图版11：10—13

Herniaria caucasica Rupr., Fl. Cauc. 1: 241. 1869; Muravjeva in Kom. Fl. USSR 6: 567. tab. 34. fig. 1. 1936.

多年生草本，全株黄绿色，被茸毛。茎铺散，多分枝，长5—15厘米，具不明显的棱，被短柔毛。叶片倒卵形或长圆形，质较厚，长4—5毫米，宽2—3毫米，无毛，顶端钝，基部渐狭成短柄状；托叶卵形，白色，膜质，具缘毛。聚伞花序顶生枝端及叶腋；苞片叶状，草质；花小，黄绿色；萼片5，长圆形或卵状披针形，长1—1.5毫米，宽0.5毫米，顶端钝尖，边缘具缘毛；雄蕊5，明显短于萼片；子房卵状长圆形，花柱外伸。瘦果与宿存萼近等长；种子扁卵圆形，直径约0.5毫米，褐色。花期7—8月，果期8—9月。

产新疆。生于海拔1400—2000米处的山坡上或山地低洼地带的草甸上。也见于中亚至高加索（模式标本产地）。

2. 大爪草族 Trib. SPERGULEAE Vierh.

Vierh. in Öesterr. Bot. Zeitschr. 57: 96. 1907; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 311. 1934.


果实为蒴果，顶端3—5裂；有花瓣，花柱3或5，离生。

约4属，我国有2属，分布于长江流域以北和西藏。

3. 大爪草属* *Spergula* L.

L., Gen. Pl. 199. 1754.

一年生或二年生草本。茎直立，分枝，腋生分枝的节间不延长。叶片线形，呈假轮生状；托叶小，膜质。花具长梗，集为聚伞花序，雌蕊花雌雄同株或雌蕊花雌雄异株；萼



图版 11 1—5. 治疝草 *Herniaria glabra* L. : 1. 植株; 2, 3. 茎的一段 (放大); 4. 花; 5. 果实。6—9. 杂性治疝草 *H. polygama* J. Gay; 6. 花枝; 7. 茎的一段 (放大); 8. 花; 9. 果实。10—13. 高加索治疝草 *H. caucasica* Rupr. : 10. 花枝; 11. 茎的一段 (放大); 12. 花; 13. 果实。(钱存源绘)