

多数，细小，扁平，边缘具翅或无翅。

约 20 种，分布于温带地区。我国有 4 种，分布于东北和西北。

属模式种：拟漆姑 *Sp. salina* J. et C. Presl.

分种检索表

1. 种子无翅。

2. 雄蕊 5 (—10) 1. 田野拟漆姑 *Sp. rubra* (L.) J. et C. Presl

2. 雄蕊 2—3 2. 二蕊拟漆姑 *Sp. diandra* (Guss.) Heldr. et Sart.

1. 种子全部或一部分具翅。

3. 种子全部具翅；雄蕊 10 3. 缘翅拟漆姑 *Sp. media* (L.) C. Presl

3. 种子一部分具翅，多数无翅；雄蕊 5 4. 拟漆姑 *Sp. salina* J. et C. Presl

1. 田野拟漆姑 (拉汉种子植物名称)

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl, Fl. Cechica 94. 1819 — *Arenaria rubra* L.
a. *campestris* L. Sp. Pl. 423. 1753. — *Spergularia campestris* (L.) Aschers. in Bot.
Zeit, 17: 292. 1859 et Fl. Prov. Brandenb. 2: 94. 1859; Gorschk. in Kom. Fl. USSR
6: 558. tab. 33. fig. 5. 1936.

一年生或有时为多年生草本，高 20—25 厘米。茎平铺或斜升，基部分枝，上部被腺毛。叶片狭线形或丝状，长 5—20 毫米，宽 0.5—1 毫米，短尖，基部稍微收缩，无毛或被短柔毛；托叶卵状披针形，顶端渐尖，白色，膜质，透明，基部连合。疏聚伞花序；花梗在果时比花萼长 2—3 倍；萼片披针形，长 3—4.5 毫米，宽 1.7 毫米；花瓣淡紫红色，倒卵形，等于或短于萼片；雄蕊 5 (—10)。蒴果卵圆形，等长于或短于宿存萼；种子小，三棱状卵形，无翅，具小疣状凸起。花期 5—7 月，果期 7—10 月。

产新疆。生于海拔 840 米路旁沙地、林中旷地和盐渍化的土壤上。欧亚温带广布。模式标本采自瑞典。

2. 二蕊拟漆姑 (拉汉种子植物名称) 图版 12: 11—12

Spergularia diandra (Guss.) Heldr. et Sart. in Heldr., Herb. Graec. Norm. n°
492. n° 1124. 1855; Boiss., Fl. Orient. 1: 733. 1867; Gorschk. in Kom. Fl. USSR 6:
557. tab. 33. fig. 2. 1936. — *Arenaria diandra* Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1: 515.
1827.

一年生草本，高 5—15 厘米，全株被短腺毛，有时下部无毛。茎匍匐或直立、纤细，分枝。叶片狭线形或几为圆柱状，长 5—20 毫米，宽 0.3—0.5 毫米，顶端钝；托叶膜质，具三棱，顶端尖，下部 1/2 或 1/3 联合。花小，集为疏总状聚伞花序；花梗细，较花萼长 2—6 倍，稍偏向一边；萼片长圆状卵形，长 1.5—2.5 毫米，宽约 1 毫米，顶端钝，边缘白色，膜质；花瓣淡紫红色，长圆状椭圆形，短于萼片；雄蕊 3 (—2)。蒴果卵圆形，