

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、山东、江苏、河南、四川、云南（洱源）。生于海拔400—2800米的沙质轻度盐地、盐化草甸以及河边、湖畔、水边等湿润处。欧洲、亚洲和非洲北部也有。模式标本采自欧洲。

3. 白鼓钉族 Trib. POLYCARPEAE Pax

Pax in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (1 b.): 85. 1889; Pax et Hoffm. 1. c. 2. Aufl. 16c: 306. 1934.

果实为蒴果，顶端3齿裂；有花瓣；花柱3，基部合生，稀全合生。

约10属，我国有3属，分布于长江流域以南至西藏。

5. 荷莲豆草属* *Drymaria* Willd. ex Roem. et Schult.

Roem. et Schult. Syst. Veg. 5: 31. 1819; Benth. et Hook. f., Gen.

Pl. 1: 152. 1862.

一年生或多年生草本。茎匍匐或近直立，二歧分枝。叶对生，叶片圆形或卵状心形，具3—5基出脉，具短柄；托叶小，刚毛状，常早落。花单生或成聚伞花序；萼片5，绿色，草质；花瓣5，顶端2—6深裂；雄蕊5，与萼片对生，花丝基部较宽；子房卵圆形，1室，具少数胚珠；花柱2—3，基部合生。蒴果卵圆形，3瓣裂，含1—2颗种子；种子卵圆形或肾形，稍扁，具疣状凸起；胚环形。

约44种，绝大部分分布于墨西哥、西印度群岛至南美（南至巴塔哥尼亚），其中埃塞俄比亚1种，温带喜马拉雅1种，爪哇至中国长江以南1种。我国有2种，产于长江以南及台湾。

属模式种：*D. cordata* (L.) Willd. ex Roem. et Schult.

分种检索表

1. 茎被长柔毛或长硬毛；花瓣与萼片近等长 1. 毛荷莲豆草 *Dr. villosa* Cham. et Schlecht.
1. 茎无毛；花瓣短于萼片 2. 荷莲豆草 *Dr. dlandra* Bl.

1. 毛荷莲豆草（西藏植物志）

Drymaria villosa Cham. et Schlecht. in Linnaea 5: 232. 1830. — *Dr. villosa* Cham. et Schlecht. subsp. *villosa* Duke in Ann. Miss. Bot. Gard. 48: 253. 1961; 西藏植物志 1: 659. 图版 227. 图 11—17. 1983.

* 荷莲豆草属（中国植物科属检索表）；荷莲豆属（种子植物名称）。