

7. 白鼓钉属* *Polycarpaea* Lam.

Lam. in Journ. Hist. Nat. Paris 2: 8. 1792.

一年生或多年生草本。茎直立或铺散。叶对生或假轮生，叶片狭线形或长圆形；托叶膜质。花多数，排成密聚伞花序；萼片5，膜质，全透明，无脊；花瓣5，小，全缘或2齿裂；雄蕊5；子房1室，具多数胚珠；花柱合生，伸长，顶端不分裂。蒴果3瓣裂；种子肾形，稍扁；胚弯。

约50种，分布于热带和亚热带地区。我国有2种。产南部和西南部。

属模式种：*P. teneriffiae* Lam.

分种检索表

1. 叶片线形或针形，宽不超过1毫米；花长约2.5毫米，花柱极短，长约为子房的1/3—1/2 1. 白鼓钉 *P. corymbosa* (L.) Lam.
1. 叶片狭长圆形至长圆形，宽1—3.5毫米；花长约4毫米；花柱长为子房2倍 2. 大花白鼓钉 *P. gaudichaudii* Gagnep.
1. 白鼓钉 (亨利氏植物汉名汇) 百花草 (广东)，满天星草 (海南) 图版13: 4—

7

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam., Tabl. Encycl. 2: 129. 1793; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 74. 1927; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 23. 1929; 广州植物志 129. 1956; 海南植物志 1: 378. 图197. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 620. 图1240. 1972. — *Achyranthes corymbosa* L., Sp. Pl. 205. 1753.

一年生草本，高15—35厘米，多少被白色柔毛。茎直立，单生，中上部分枝，被伏柔毛。叶假轮生状，叶片狭线形或针形，长1.5—2厘米，宽约1毫米，顶端急尖，近无毛，中脉明显；托叶卵状披针形，顶端急尖，长2—4毫米，干膜质，白色，透明。花密集成聚伞花序，多数；苞片披针形，透明，膜质，长于花梗；花梗细，被白色伏柔毛；萼片披针形，长2—3毫米，宽0.5—1毫米，顶端渐尖，基部稍圆，白色，透明，膜质；花瓣宽卵形，顶端钝，长不及萼片1/2；雄蕊短于花瓣；子房卵形，花柱短，顶端不分裂。蒴果卵形，褐色，长不及宿存萼的1/2；种子肾形，扁，长0.5毫米，宽0.25—0.3毫米，褐色。花期7—8月，果期9—10月。

产云南 (禄劝、元谋)、广西、广东、海南、江西、安徽、福建、台湾。生于海拔210—1150米的山坡沙土草丛中或水边沙滩湿地上。热带至亚热带广布。

* 白鼓钉属 (种子植物名称)。