

5. 石孩儿参 (新拟) 石假繁缕 (东北植物检索表) 图版 14: 7—8

Pseudostellaria rupestris (Turcz.) Pax in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 318. 1934; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 201. 1939. — *Krascheninnikowia rupestris* Turcz., Fl. Baic. -Dahur. 1: 238. 1842; Ledeb., Fl. Ross. 1: 373. 1842; Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou 35 (1): 260. tab. 2. fig. 7—11. 1862; Muravjeva in Kom. Fl. USSR 6: 426. tab. 22. fig. 6. 1936; Грубов, Консп. Фл. Монг. Нар. 127. 1955; Попов, Фл. Сред. Сиб. 1: 413. 1957; 东北植物检索表 54. 1959; Байтенов и Повлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 339. 1960.

多年生草本，高约 8 厘米。块根球状或宽椭圆状，长约 1 厘米。茎直立，纤细，不分枝或上部稀疏分枝，无毛或被 1—2 列短毛。叶片披针形、倒披针形或狭长圆形，长 1—3 厘米，宽 3—8 毫米，顶端急尖，基部渐狭成短柄，无毛或边缘具缘毛。开花受精花顶生或腋生；花梗无毛或被短柔毛；萼片长圆状披针形，边缘白色，膜质，沿脉被疏毛；花瓣白色，长圆形，比萼片约长 $\frac{1}{3}$ ，全缘，稀顶端微凹；雄蕊 10，与花瓣近等长；花柱 3，稀为 2。闭花受精花小形，生于茎下部叶腋；花梗长约 12 毫米。蒴果卵圆形；种子小，褐色，表面具锚状刺凸。花期 5—6 月，果期 7—9 月。

产吉林、内蒙古、青海。生于海拔 3 000 米处云杉林下或多石质山坡。俄罗斯和蒙古也有。模式标本采自外贝加尔。

6. 异花孩儿参 (中国高等植物图鉴补编) 异花假繁缕 (中国高等植物图鉴)

Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 318. 1934; 中国高等植物图鉴 1: 626. 图 1252. 1972; 中国高等植物图鉴补编 1: 292. 1982, in clavi. — *Krascheninnikowia heterantha* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 18: 376. 1873.

多年生草本，高 8—15 厘米。块根纺锤形。茎单生，直立，基部分枝，具 2 列柔毛。茎中部以下叶叶片倒披针形，顶端尖，基部渐狭成柄；中部以上的叶片倒卵状披针形，长 2—2.5 厘米，宽 0.8—1.2 厘米，具短柄，基部疏生缘毛。开花受精花顶生或腋生；花梗细，长 3—3.5 厘米，被柔毛；萼片 5，披针形，长 3—4 毫米，绿色，外面被柔毛，边缘具缘毛；花瓣 5，白色，长圆状倒披针形，长于萼片，顶端钝圆或急尖；雄蕊 10，稍短于花瓣，花药紫色；花柱 2—3。闭花受精花腋生；花梗短；萼片 4，披针形，长 2—3 毫米；花柱 2，极短。蒴果卵圆形，直径 3.5—4 毫米，稍长于宿存萼，4 瓣裂；种子肾形，稍扁，表面具极低瘤状凸起。花期 5—6 月，果期 7—8 月。

产内蒙古 (贺兰山)、河北、陕西 (太白山)、安徽、河南、四川、云南、西藏。生于山地林下。日本、俄罗斯 (远东地区) 也有。模式标本采自日本。

7. 须弥孩儿参 (新拟) 图版 15: 4—6

Pseudostellaria himalaica (Franch.) Pax in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam.