

或线状匙形;种子直径约1毫米。

17. 叶片线状披针形,叶缘无睫毛;花瓣长圆状倒心形,顶端微凹,长约9毫米,宽5毫米
 11. 天山卷耳 *C. tianschanicum* Schischk.
 17. 叶片线状倒披针形,叶缘具稀疏睫毛;花瓣线状匙形,顶端圆形,长3.5毫米,宽0.3—0.5毫米
 18. 细叶卷耳 *C. subpilosum* Hayata

1. 六齿卷耳 (东北植物检索表) 图版 17: 1—6

Cerastium cerastoides (L.) Britt. in Mem. Torr. Bot. Club 5: 150. 1894; Hegi, Illustr. Fl. Mittel-Europ. 3: 362. fig. 600a—d. 1912; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 435. tab. 22. fig. 8. 1936; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 196. 1939; Грубов, Консп. Фл. Монг. Нар. Респ. 128. 1955; Попов, Фл. Сред. Сиб. 1: 404. 1957; 东北植物检索表 54. 图版 1. 1959; Павлов, Фл. Казахст. 3: 340. табл. 32. рис. 4. 1960; 东北草本植物志 3: 8. 1975; 中国高等植物图鉴补编 1: 294. 图 8544. 1982. — *Stellaria cerastoides* L., Sp. Pl. 422. 1753. — *Cerastium trigynum* Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 645. tab. 46. 1789; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 396. 1842; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22 (Fl. Mansh. 2): 184. 1903.

多年生草本,高10—20厘米。茎丛生,基部稍匍生,节上生根,上部分枝,密生柔毛。叶片线状披针形,长0.8—2厘米,宽1.5—2(—3)毫米,顶端渐尖,叶腋具不育短枝。聚伞花序,具3—7花,稀单生;苞片草质,披针形;花梗长1.5—2厘米,密被短腺柔毛,果时下折;萼片宽披针形,长4—6(7)毫米,边缘膜质,具单脉,近无毛;花瓣倒卵形,长8—12毫米,顶端2浅裂至1/4;雄蕊10;花柱3。蒴果圆柱状,长10—12毫米,6齿裂;种子圆肾形,略扁,具疣状凸起。花期5—8月,果期8—9月。

产吉林、辽宁、新疆(生于海拔1050—2400米的山谷水边草地)和西藏(生于海拔3300—5100米)。全欧洲高山、中亚、西伯利亚、小亚细亚、伊朗、阿富汗、印度、喜马拉雅山区、蒙古、格陵兰、北美也有。

2. 疏花卷耳 (新拟)

Cerastium pauciflorum Stev. ex Ser. in DC. Prodr. 1: 414. 1824; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 439. 1936; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 196. 1939. — *C. ledebourianum* Ser. in DC. Prodr. 1: 420. 1824. — *C. pilosum* Ledeb. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 5: 539. 1815; Ledeb., Icon. Pl. Fl. Ross. 351. tab. 4. 1833; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 398. 1842; Turcz., Fl. Baic.-Dahur. 1: 240. 1842.

2a. 疏花卷耳 (原变种)