

-Dahur. 1: 241. 1842; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 444. 1936; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 342. табл. 32. рис. 7. 1960; 中国高等植物图鉴补编 1: 295. 图 8545. 1982. — *C. amplexicaule* Sims in Curtis's Bot. Mag. 3: pl. 92 tab. 1789. 1816.

多年生草本，高 50—100 厘米，全株近无毛或被疏长柔毛。茎粗壮，上升，具纵纹。叶片长圆形至椭圆形，长 5—8 厘米，宽 1.5—3 厘米，顶端钝或急尖，基部无柄，有垂耳，稍抱茎。聚伞花序顶生；苞片卵形；花梗长 1—2.5 (—6) 厘米；花直径 3 厘米；萼片 5，椭圆状长圆形或卵状披针形，长 8—12 毫米，宽 3.5—5 毫米，有光泽，顶端急尖，边缘膜质；花瓣白色，倒心形，长为花萼 1.5—2 倍，顶端浅 2 裂，爪具毛；雄蕊与萼片等长；花柱 5。蒴果长圆形，长为宿存萼 1.5—2 倍，直立；种子暗褐色，近三角状扁圆形，具疣状凸起。花期 6—7 月，果期 8—9 月。

产新疆（乌鲁木齐、沙湾、昭苏）。生于海拔（1 000—）1 900—2 400 (—2 800) 米山地灌丛中。伊朗、哈萨克、俄罗斯、蒙古也有。模式标本采自外贝加尔。

花、叶皆大，可供观赏。

7. 抱茎叶卷耳（拉汉种子植物名称）

Cerastium perfoliatum L., Sp. Pl. 437. 1753; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 402. 1842; Boiss., Fl. Orient. 1: 719. 1867; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 446. tab. 23. fig. 5. 1936.

一年生草本，高 10—40 厘米，全株近无毛，稍带粉绿色。茎直立，分枝，被稀疏短柔毛。基生叶叶片椭圆状披针形，基部渐狭成柄状；茎生叶无柄，叶片卵状椭圆形至卵形，长 3—4 厘米，宽 1—1.5 厘米，顶端急尖或钝，基部抱茎，两面均被疏柔毛或近无毛，边缘有时具缘毛。聚伞花序顶生，具数花或多数花；苞片草质；花梗细，被柔毛，长于花萼 1 至数倍；萼片宽披针形，长约 6 毫米，外面疏被柔毛，边缘宽膜质；花瓣白色，长圆形，与萼片近等长（原记载微短于萼片），无毛；雄蕊短于萼片；花柱 5，线形。蒴果圆柱形，比宿存萼长 1 倍或更长，顶端 10 齿裂；种子扁圆形，褐色，具疣状凸起。花期 4—5 月，果期 5—6 月。

产浙江（天台）。生于多石的山坡草地、灌丛。地中海、巴尔干、小亚细亚和俄罗斯也有。

8. 球序卷耳（拉汉种子植物名称） 婆婆指甲菜（植物名实图考），圆序卷耳（西藏植物志） 图版 19: 1—5

Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2. 226. 1800; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 450. 1936; 湖北植物志 1: 297. 图版 410. 1976; 中国高等植物图鉴补编 1: 296. 图 8547. 1982; 西藏植物志 1: 666. 1983. — *C. viscosum* L., Sp. Pl. 51. 1753, p. p. nom. ambig.; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 404. 1842; Boiss., Fl. Orient.