

-Dahur. 1: 241. 1842; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 444. 1936; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 342. табл. 32. рис. 7. 1960; 中国高等植物图鉴补编 1: 295. 图 8545. 1982. — *C. amplexicaule* Sims in Curtis's Bot. Mag. 3: pl. 92 tab. 1789. 1816.

多年生草本，高 50—100 厘米，全株近无毛或被疏长柔毛。茎粗壮，上升，具纵纹。叶片长圆形至椭圆形，长 5—8 厘米，宽 1.5—3 厘米，顶端钝或急尖，基部无柄，有垂耳，稍抱茎。聚伞花序顶生；苞片卵形；花梗长 1—2.5 (—6) 厘米；花直径 3 厘米；萼片 5，椭圆状长圆形或卵状披针形，长 8—12 毫米，宽 3.5—5 毫米，有光泽，顶端急尖，边缘膜质；花瓣白色，倒心形，长为花萼 1.5—2 倍，顶端浅 2 裂，爪具毛；雄蕊与萼片等长；花柱 5。蒴果长圆形，长为宿存萼 1.5—2 倍，直立；种子暗褐色，近三角状扁圆形，具疣状凸起。花期 6—7 月，果期 8—9 月。

产新疆（乌鲁木齐、沙湾、昭苏）。生于海拔（1 000—）1 900—2 400 (—2 800) 米山地灌丛中。伊朗、哈萨克、俄罗斯、蒙古也有。模式标本采自外贝加尔。

花、叶皆大，可供观赏。

7. 抱茎叶卷耳（拉汉种子植物名称）

Cerastium perfoliatum L., Sp. Pl. 437. 1753; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 402. 1842; Boiss., Fl. Orient. 1: 719. 1867; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 446. tab. 23. fig. 5. 1936.

一年生草本，高 10—40 厘米，全株近无毛，稍带粉绿色。茎直立，分枝，被稀疏短柔毛。基生叶叶片椭圆状披针形，基部渐狭成柄状；茎生叶无柄，叶片卵状椭圆形至卵形，长 3—4 厘米，宽 1—1.5 厘米，顶端急尖或钝，基部抱茎，两面均被疏柔毛或近无毛，边缘有时具缘毛。聚伞花序顶生，具数花或多数花；苞片草质；花梗细，被柔毛，长于花萼 1 至数倍；萼片宽披针形，长约 6 毫米，外面疏被柔毛，边缘宽膜质；花瓣白色，长圆形，与萼片近等长（原记载微短于萼片），无毛；雄蕊短于萼片；花柱 5，线形。蒴果圆柱形，比宿存萼长 1 倍或更长，顶端 10 齿裂；种子扁圆形，褐色，具疣状凸起。花期 4—5 月，果期 5—6 月。

产浙江（天台）。生于多石的山坡草地、灌丛。地中海、巴尔干、小亚细亚和俄罗斯也有。

8. 球序卷耳（拉汉种子植物名称） 婆婆指甲菜（植物名实图考），圆序卷耳（西藏植物志） 图版 19: 1—5

Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2. 226. 1800; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 450. 1936; 湖北植物志 1: 297. 图版 410. 1976; 中国高等植物图鉴补编 1: 296. 图 8547. 1982; 西藏植物志 1: 666. 1983. — *C. viscosum* L., Sp. Pl. 51. 1753, p. p. nom. ambig.; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 404. 1842; Boiss., Fl. Orient.



图版 19 1—5. 球序卷耳 *Cerastium glomeratum* Thuill. : 1. 植株; 2. 花解剖 (去掉部分萼片和花瓣); 3. 花瓣和雄蕊; 4. 带萼的果实; 5. 种子。6—10. 缘毛卷耳 *C. furcatum* Cham. et Schlecht. : 6. 植株一部分; 7. 花解剖; 8. 花瓣和雄蕊; 9. 带萼的果实; 10. 种子。(李志民绘)

1: 722. 1867. — *C. vulgatum* L. var. *glomeratum* (“a” sic!) (Thuill.) Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 228. 1874.

一年生草本，高10—20厘米。茎单生或丛生，密被长柔毛，上部混生腺毛。茎下部叶叶片匙形，顶端钝，基部渐狭成柄状；上部茎生叶叶片倒卵状椭圆形，长1.5—2.5厘米，宽5—10毫米，顶端急尖，基部渐狭成短柄状，两面皆被长柔毛，边缘具缘毛，中脉明显。聚伞花序呈簇生状或呈头状；花序轴密被腺柔毛；苞片草质，卵状椭圆形，密被柔毛；花梗细，长1—3毫米，密被柔毛；萼片5，披针形，长约4毫米，顶端尖，外面密被长腺毛，边缘狭膜质；花瓣5，白色，线状长圆形，与萼片近等长或微长，顶端2浅裂，基部被疏柔毛；雄蕊明显短于萼；花柱5。蒴果长圆柱形，长于宿存萼0.5—1倍，顶端10齿裂；种子褐色，扁三角形，具疣状凸起。花期3—4月，果期5—6月。

产山东、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、云南（维西）、西藏（亚东）。生于山坡草地。全世界几全有分布。

本种花果皆小，过去与簇生卷耳 [*C. fontanum* Baumg. subsp. *triviale* (Link) Jalas] 常相混，但本种叶倒卵状匙形，顶端钝，花序常密集呈头状；下部花的花瓣和雄蕊一部分退化。

9. 缘毛卷耳(中国高等植物图鉴) 高山卷耳(东北草本植物志) 图版19:6—10

Cerastium furcatum Cham. et Schlecht. in Linnaea 1: 61. 1826; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 454. 1936; Попов., Фл. Сред. Сиб. 1: 403. 1957; 中国高等植物图鉴 1: 634. 图1267. 1972; 秦岭植物志 1 (2): 206. 1974; 东北草本植物志 3: 11. 图版3. 图5—9. 1975; 中国高等植物图鉴补编 1: 294. 1982, in clavi; 西藏植物志 1: 666. 1983. — *C. rigidum* Ledeb. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 5: 538. 1815, non (Scop.) Vitm. 1789. — *C. vulgatum* β. *bravifolium* et γ. *acutifolium* Franch., Pl. Delav. 101. 1889. — *C. ciliatum* var. *acutifolium* (Franch.) Hand. -Mazz. et var. *brevifolium* (Franch.) Hand. -Mazz., Symb. Sin. 7: 193. 1929 — *C. rubescens* Mattf. in Notizbl. 11: 333. 1932. — *C. amurense* Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 4: 32. 1935, excl. basonym. — *C. ciliatum* Ohwi in Journ. Jap. Bot. 12: 334. 1936. — *C. ciliatum* acut., non Waldst. et Kitaib. (1805); Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou 15: 616. 1842; Hand. -Mazz., Symb. Sin. 7: 193. 1929. — *C. fischerianum* auct., non Ser.; 东北植物检索表 54. 图版1. 图6. 1959.

多年生草本，高10—55厘米。茎单生或丛生，近直立，被稀疏或较密长柔毛，上部混生腺毛。基生叶叶片匙形；茎生叶叶片卵状披针形至椭圆形，长1—3厘米，宽4—11毫米，顶端钝或急尖，基部近圆形或楔形，多少被柔毛。聚伞花序具5—11朵花；苞片草质；花梗细，长1—3.5厘米，密被柔毛和腺毛，果期弯垂；萼片5，长圆状披针形，长约5毫米，顶端尖或钝，被柔毛；花瓣5，白色，倒心形，长于花萼0.5—1倍，顶端2