

浅裂，基部被缘毛；雄蕊 10，花丝扁线形，中下部被疏长柔毛；花柱 5，线形，有时被毛。蒴果长圆形，比宿存萼长 1 倍；种子扁圆形，褐色，具细条形疣状凸起。花期 5—8 月，果期 8—9 月。

产吉林（长白山）、山西、陕西（太白山）、宁夏、甘肃、四川（马尔康、灌县、峨眉、木里、盐边）、云南（鹤庆、丽江、中甸、德钦）、西藏。生于海拔 2 300—3 350 米（云南在 3 300—3 800 米）的高山林缘及草甸。俄罗斯、朝鲜（北部）、蒙古也有。模式标本采自西伯利亚。

#### 10. 喜泉卷耳（新拟）

*Cerastium fontanum* Baumg., Enum. Stirp. Transs. 1: 425. 1816.

##### 10a. 喜泉卷耳（原亚种）

subsp. *fontanum*

产于欧洲、亚洲西部和非洲北部。我国无分布。

##### 10b. 簇生卷耳（亚种）（中国高等植物图鉴） 图版 20: 1—6

subsp. *triviale* (Link) Jalas in Arch. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo 18: 63. 1963; Hara in Journ. Jap. Bot. 52 (9): 258. 1977; 西藏植物志 1: 663. 1983. ——*C. vulgatum* L., Sp. Pl. ed. 2. 627. 1762. ——*C. caespitosum* Gilib. in Fl. Lith. 2: 159. 1781, nom. illeg.; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 455. 1936; 中国高等植物图鉴 1: 634. 图 1268. 1972; 中国高等植物图鉴补编 1: 293. 1982, in clavi; 秦岭植物志 1 (2): 205. 175. 1974; 湖北植物志 1: 298. 图 412. 1976. ——*C. triviale* Link, Enum. Pl. Hort. Berol. 1: 433. 1821.

多年生或一、二年生草本，高 15—30 厘米。茎单生或丛生，近直立，被白色短柔毛和腺毛。基生叶叶片近匙形或倒卵状披针形，基部渐狭呈柄状，两面被短柔毛；茎生叶近无柄，叶片卵形、狭卵状长圆形或披针形，长 1—3 (4) 厘米，宽 3—10 (12) 毫米，顶端急尖或钝尖，两面均被短柔毛，边缘具缘毛。聚伞花序顶生；苞片草质；花梗细，长 5—25 毫米，密被长腺毛，花后弯垂；萼片 5，长圆状披针形，长 5.5—6.5 毫米，外面密被长腺毛，边缘中部以上膜质；花瓣 5，白色，倒卵状长圆形，等长或微短于萼片，顶端 2 浅裂，基部渐狭，无毛；雄蕊短于花瓣，花丝扁线形，无毛；花柱 5，短线形。蒴果圆柱形，长 8—10 毫米，长为宿存萼的 2 倍，顶端 10 齿裂；种子褐色，具瘤状凸起。花期 5—6 月，果期 6—7 月。

产河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、河南、江苏、安徽、福建、浙江、湖北、湖南、四川、云南。生于海拔 1 200—2 300 米的山地林缘杂草间或疏松沙质土壤。蒙古、朝鲜、日本、越南、印度、伊朗也有。

#### 11. 天山卷耳（拉汉种子植物名称） 图版 20: 7—11

*Cerastium tianschanicum* Schischk. in Act. Inst. Bot. Acad. Soc. USSR ser. 1,