

多年生草本，高25—35厘米。根细长。茎上升，近无毛。基生叶叶片匙形，基部渐狭成长柄状；茎生叶叶片卵状椭圆形，无柄，长1.5—2.5厘米，宽8—12毫米，顶端急尖，沿中脉和基部被长毛。聚伞花序顶生，具多数花，花序梗细长，具腺柔毛；苞片草质，小形，被柔毛；花梗细，具腺柔毛，长短不等，可达3厘米；萼片5，披针形或宽披针形，长约6毫米，顶端急尖，边缘膜质，外面被短柔毛；花瓣5，白色，狭倒卵形，长为萼片2倍，2裂至中部，裂片披针形，顶端尖，无毛；雄蕊稍长于萼片，无毛；花柱5，线形。蒴果圆柱形，长为宿存萼1/2，裂齿10，直伸；种子近三角状球形，直径约1毫米，稍扁，褐色，具疣状凸起。花期4—5月，果期6—7月。

产陕西（南部）、甘肃、安徽、河南、湖北（鹤峰）、四川、云南。生于海拔1170—2000米的山坡或林缘。模式标本采自湖北西部。

15. 山卷耳（拉汉种子植物名称） 图版22: 1—6

Cerastium pusillum Ser. in DC. Prodr. 1: 418. 1824; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 458. tab. 24. fig. 2. 1936. — *C. vulgatum* η . *leiopetalum* Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 410. 1842. — *C. alpinum* var. *glanduliferum* Trautv. in Bull. Soc. Nat. Moscou 33(1): 161. 1861, non Koch.

多年生草本，高5—15厘米。须根纤细。茎丛生，上升，密被柔毛。茎下部叶较小，叶片匙状，顶端钝，基部渐狭成短柄状，被长柔毛；茎上部叶稍大，叶片长圆形至卵状椭圆形，长5—15毫米，宽3—7毫米，顶端钝，基部钝圆或楔形，两面均密被白色柔毛，边缘具缘毛，下面中脉明显。聚伞花序顶生，具2—7朵花；苞片草质；花梗细，长5—8毫米，密被腺柔毛，花后常弯垂；萼片5，披针状长圆形，长5—6毫米，下面密被柔毛，顶端两侧宽膜质，有时带紫色；花瓣5，白色，长圆形，比萼片长1/3—1/2，基部稍狭，顶端2浅裂至1/4处；花柱5，线形。蒴果长圆形，10齿裂；种子褐色，扁圆形，具疣状凸起。花期7—8月，果期8—9月。


产宁夏、甘肃、青海、新疆、云南（维西）。生于海拔2800—3200米的高山草地。俄罗斯、哈萨克、蒙古也有。

本种产欧、亚两洲，通常花序具1—3花，但上述标本则花多为2—7朵成簇，花形亦略小。

16. 长白卷耳（东北草本植物志）

Cerastium baischanense Y. C. Chu in Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Orient. 3: 12. tab. 4. fig. 1—4. Addenda 227. 1975.

多年生草本，高6—20厘米，全株密被开展柔毛。茎丛生，细弱，稍上升。茎下部叶叶片倒披针形，较小，顶端急尖，基部渐狭成短柄，两面及边缘均被疏柔毛；中上部茎生叶较大，叶片披针形或线状披针形，长1.3—2厘米，宽2—4毫米，顶端急尖，基部楔形，中脉明显，叶腋具不育短枝。聚伞花序顶生，具3—5朵花；苞片草质，宽披针



图版 22 1—6. 山卷耳 *Cerastium pusillum* Ser.: 1. 植株; 2. 花解剖 (示花萼、花瓣和雌、雄蕊); 3. 萼片; 4. 花瓣和雄蕊; 5. 果实; 6. 种子。7—12. 卷耳 (原变种) *C. arvense* L. var. *arvense*: 7. 植株; 8. 花解剖; 9. 萼片; 10. 花瓣和雄蕊; 11. 果实; 12. 种子。(钱存源绘)