

形，顶端急尖，被疏柔毛；花梗长4—15毫米，密被开展的毛；萼片长圆状披针形或近长圆形，长4—5毫米，顶端钝，外面被疏柔毛，边缘膜质；花瓣白色，比萼片稍长，长圆状倒卵形，长5—5.5毫米，宽2—2.5毫米，顶端2裂，达花瓣1/5—1/4处，基部楔形，无毛；雄蕊10，比花瓣短，花丝无毛；花柱5。蒴果圆柱形，长8—10毫米，10齿裂，裂齿直立；种子宽卵形，稍扁，长0.7—0.8毫米，被疣状凸起。花期6—8月，果期7—8月。

产吉林。生于高山冻原或温泉附近的多石质火山口湖一带。模式标本采自吉林安图。

17. 卷耳 (中国高等植物图鉴)

Cerastium arvense L., Sp. Pl. 438. 1753; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 452. 1842; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 460. 1936; 中国高等植物图鉴 1: 633. 图 1266. 1972; 秦岭植物志 1(2): 206. 1974; 内蒙古植物志 2: 178. 图版 94. 图 1—6. 1978.

17a. 卷耳 (原变种) 图版 22: 7—12

var. *arvense*

多年生疏丛草本，高10—35厘米。茎基部匍匐，上部直立，绿色并带淡紫红色，下部被下向的毛，上部混生腺毛。叶片线状披针形或长圆状披针形，长1—2.5厘米，宽1.5—4毫米，顶端急尖，基部楔形，抱茎，被疏长柔毛，叶腋具不育短枝。聚伞花序顶生，具3—7花；苞片披针形，草质，被柔毛，边缘膜质；花梗细，长1—1.5厘米，密被白色腺柔毛；萼片5，披针形，长约6毫米，宽1.5—2毫米，顶端钝尖，边缘膜质，外面密被长柔毛；花瓣5，白色，倒卵形，比萼片长1倍或更长，顶端2裂深达1/4—1/3；雄蕊10，短于花瓣；花柱5，线形。蒴果长圆形，长于宿存萼1/3，顶端倾斜，10齿裂；种子肾形，褐色，略扁，具瘤状凸起。花期5—8月，果期7—9月。

产河北、山西、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川。生于海拔1200—2600米高山草地、林缘或丘陵区。中欧、北欧、北极、俄罗斯、哈萨克、朝鲜、日本、蒙古、北美也有。

17b. 狭叶卷耳 (变种) (拉汉种子植物名称) 细叶卷耳 (东北草本植物志)

var. *angustifolium* Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 413. 1842; Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou 35 (1): 326. 1862; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22 (Fl. Mansh. 2): 183. 1903. (in textu); Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 463. 1936. (in textu); Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 195. 1939; 东北草本植物志 3: 11. 图版 4. 图 5—9. 1975. — *C. arvense* auct., non L.: 东北植物检索表 54. 图版 1. 图 5. 1959.

本变种与原变种不同之处在于：叶片线形或线状披针形，长1—2.5厘米，宽1.3毫米，顶端尖，两面及边缘疏被短柔毛。花期5—6月，果期7—8月。

产河北(白石山)、内蒙古(阿尔山)、新疆。生于砂丘灌丛、山沟草丛。俄罗斯、蒙古也有。