

17c. 无毛卷耳 (变种) (东北草本植物志)

var. **glabellum** (Turcz.) Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 452. 1842; Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou 35 (1): 327. 1862; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 463. 1936, in textu; 东北植物检索表 54. 1959. —*Cerastium glabellum* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou 15: 614. 1842.

本变种与原变种不同之处在于: 全株无毛; 叶片线状披针形或狭披针形, 长 5—15 毫米, 宽 1—3 毫米。花期 5—6 月, 果期 7—8 月。

产内蒙古。生于海拔 580—1 000 米的砂丘樟子松林下及草原砂质地。俄罗斯、蒙古(北部)也有。

18. 细叶卷耳 (台湾植物志) 少毛卷耳 (拉汉种子植物名称)

Cerastium subpilosum Hayata, Icon. Pl. Formos. 3: 39. 1913; Kudo et Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard. 2: 70. 1932; 台湾植物志 2: 326. pl. 314. 1976. —*C. pilosum* auct., non. Ledeb.; Hayata in Journ. Coll. Soc. Univ. Tokyo 25: 58. 1908. —*Arenaria subpilosa* (Hayata) Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 6: 145. 1937. —*Cerastium taiwanense* T. Sh. Liu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 4: 2. 1951.

多年生草本, 高 30—40 厘米, 被细柔毛。叶无柄, 叶片线状倒披针形, 长 3.5—4 厘米, 宽约 4 毫米, 顶端急尖, 基部渐狭, 上面具芒状毛, 下面无毛, 灰白色, 边缘具稀疏缘毛。聚伞花序疏散; 花梗细, 长 1—2 厘米, 被粘液和疏柔毛; 萼片卵状长椭圆形, 长 2—3 毫米, 宽约 1 毫米, 顶端钝, 下面及边缘具稀疏柔毛; 花瓣 5, 线状匙形, 长 3.5 毫米, 宽 0.3—0.5 毫米, 顶端圆形, 基部截形; 雄蕊 5; 花柱 3—5。蒴果圆柱状, 长约 3.5 毫米, 宽约 2 毫米, 顶端截形, 基部钝, 8—10 齿裂; 种子长椭圆状球形, 微扁平, 长 1 毫米, 变红色, 具瘤状凸起。

产我国台湾。生于海拔 3 000—3 900 米的山坡上。模式标本采自新高山 (Mt. Morrison)。

11. 繁缕属* *Stellaria* L.

L., Sp. Pl. 421. 1753 et Gen. Pl. 193. 1754; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 1: 149. 1862.

一年生或多年生草本。叶扁平, 有各种形状, 但很少针形。花小, 多数组成顶生聚伞花序, 稀单生叶腋; 萼片 5, 稀 4; 花瓣 5, 稀 4, 白色, 稀绿色, 2 深裂, 稀微凹或多裂, 有时无花瓣; 雄蕊 10, 有时少数 (8 或 2—5); 子房 1 室, 稀幼时 3 室, 胚珠多数,

* 繁缕属 (中国高等植物科属检索表)。