

俄罗斯(西西伯利亚)、哈萨克、蒙古也有。模式标本采自准噶尔至阿尔泰。

系 4. 硬骨草系 Ser. *Holosteae* Fenzl in Endl. Gen. Pl. 969. 1840; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 401. 1936.

叶片线状披针形; 苞片草质; 萼片具不明显的脉; 雄蕊 5, 花柱 3。

我国仅有 1 种。

24. 湖北繁缕 (湖北植物志)

Stellaria henryi Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 34: 434. 1899; 湖北植物志 1: 292. 图 401. 1976; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. 7 (1): 75. 1985.

一年生草本, 高 15—30 厘米。茎单生, 近直立, 细弱, 上部分枝, 无毛或被疏柔毛。叶片线状披针形, 长 1—2 厘米, 宽 3—5 毫米, 顶端渐尖, 基部宽楔形, 两面无毛, 具单脉, 边缘有时微波状; 叶柄短, 长约 2 毫米。花单生或为聚伞花序, 由叶腋生出; 花梗长 1—2.5 厘米; 萼片 5, 披针形, 有时散生紫色硬毛; 花瓣 5, 2 深裂, 长为花萼的 1.5 倍; 雄蕊 5, 花丝细; 子房椭圆形; 花柱 3, 短线形, 略短于子房。蒴果圆球形, 6 裂; 种子未见。 花期 4—5 月, 果期 6—9 月。

产四川南部、湖北西部(巴东)。生于山坡石缝中。模式标本采自四川南部。

种子供药用, 有生津止渴、平喘顺气之功效。

亚组 2. 雀舌草亚组 Subsect. *Larbraea* (St. Hil.) Fenzl in Endl. Gen. Pl. 969. 1840. — *Larbraea* St. Hil. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 2: 287. 1815, pro gen.

萼片多少在基部合生成倒锥形; 雄蕊周位; 种子多数; 叶一般较狭, 全部叶无柄或近无柄; 茎通常具棱, 稀平滑。

我国有 7 系 28 种 5 变种 2 变型。

系 1. 叶苞系 Ser. *Foliaceo-bracteatae* Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 402. 1936.

叶片卵状披针形或披针形, 长超过宽 1.5—3 倍; 花小形, 长达 4 毫米。

我国有 3 种及 1 变种。

25. 无苞繁缕

Stellaria ebracteata Kom. in Act. Hort. Petrop. 18: 441. 1901 et l. c. 22: tab. 3, 4. 1904; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 404. 1936.

多年生草本 (Komarov 原作一年生)。根纤细, 丝状。茎单一, 不分枝, 上升或直立, 高 15—20 厘米 (原误作 1.5—2 厘米), 具细条纹, 一侧具毛。叶无柄或具短柄, 叶片质薄, 卵状披针形或披针形, 长 2—3 厘米, 宽 0.4—1 厘米, 顶端急尖, 无毛或下面和边缘被疏毛。花单生, 稀成对顶生, 直径达 8 毫米, 通常具 2—3 厘米的长梗, 被极短柔毛;