

我国有4种及1变种。

30. 小繁缕 (云南植物研究)

Stellaria pusilla E. Schmid in Fedde, Repert. Sp. Nov. **3**: 41. 1932; C. Y. Wu in Act. Bot. Yunnan. **13** (4): 363. 1991.

多年生, 草本。茎偃卧, 丛生, 近四棱, 具光泽, 无毛, 向上被稀疏微柔毛。叶片披针形或狭卵形, 长4—12毫米, 无柄, 下部者向基部渐狭成柄, 顶端渐尖, 单脉, 无毛, 边缘软骨质, 基部具缘毛。苞片卵圆状披针形, 急尖, 具宽而白色边缘; 聚伞花序1—3花, 花长与花萼相等或较长; 萼片5, 披针形, 长5—6毫米, 顶端渐尖, 边缘白色, 膜质, 绿色或带紫色; 花瓣2裂, 与萼片等长; 雄蕊10, 略短于花瓣; 花柱3, 子房多胚珠。蒴果卵圆形。(模式标本未见, 据原描写译成)。

产西藏西部(班公湖及楚桑泊), 生于海拔5 000—5 450米和新疆西部(天山至塔什库尔干), 生于海拔4 050—4 700米。在西藏常与 *Arenaria strachey* Edgew. 生长在一处(据 E. Schmid)。

原作者认为本种与雀舌草 *St. uliginosa* Murr. 相近。

周太炎等 651313 (采自天山, 藏华南所) 和青藏队 870451 (采自塔什库尔干的红旗拉甫, 4 050米, 藏昆明所) 及武素功等 4879 (同上) 与上述描写基本相符, 暂定为本种。

31. 米林繁缕 (西藏植物志)

Stellaria mainlingensis L. H. Zhou in C. Y. Wu, Fl. Xizang. **1**: 693. fig. 221: 6—10. 1983; C. Y. Wu in Act. Bot. Yunnan. **13** (4): 363. 1991.

茎疏丛生, 高10—20厘米, 较细, 淡褐色, 被倒向微柔毛。叶片卵状披针形, 长0.5—1厘米, 宽1.5—3毫米, 顶端尖, 基部圆形, 无柄, 边缘软骨质, 中脉凸起, 褐色, 无毛。聚伞花序具数花; 苞片与叶同形而小; 花梗纤细, 长0.5—3厘米, 被倒向微柔毛; 萼片5, 披针形, 长约4毫米, 顶端尖, 边缘膜质, 无毛, 具不明显的3脉; 花瓣5, 白色, 稍长于萼片, 2深裂至基部; 雄蕊10, 花丝长约3毫米, 花药灰绿色; 子房倒卵形, 长约1.5毫米; 花柱3, 长约3毫米。果实未见。

产我国西藏东南部(米林)至南部(聂拉木)。生于海拔2 500—3 600米的山坡水沟或小河边。模式标本采自米林。

32. 矮陷繁缕 (云南植物研究)

Stellaria depressa E. Schmid in Fedde, Repert. Sp. Nov. **3**: 41. 1932; C. Y. Wu in Act. Bot. Yunnan. **13**(4): 363. 1991.

多年生丛生草本。茎偃卧, 长达12厘米, 节上生根, 具光泽, 无毛, 但较顶部被微柔毛。叶片卵状披针形, 长3—7毫米, 顶端略钝, 边缘软骨质, 单脉, 无毛。苞片卵状披针形, 渐尖, 膜质; 聚伞花序具2—7花; 花梗与花萼等长; 萼片5, 卵状披针形, 长3—4毫米, 顶端略钝, 边缘宽, 白色、绿色或带紫色, 无毛; 花瓣2裂, 稍短于萼片; 雄