

梗纤细，长1—2.5厘米，无毛；苞片膜质，披针形，长1—2毫米；萼片披针形，长4—5毫米，具明显的3脉，顶端长渐尖，基部稍圆形，边缘透明，膜质；花瓣白色，微短于萼片，2深裂几达基部，裂片狭线形；雄蕊10，略短于花瓣，花药褐色，长圆形；子房卵圆形，花柱3，线形。蒴果卵圆形，与宿存萼等长或稍短，顶端6裂；种子长卵圆形，深褐色，长不过1毫米，具皱纹。花期5—6月，果期7—8月。

产宁夏、甘肃、陕西（秦岭）、四川（东北部）、湖北（宜昌）、湖南（大庸）、浙江（天目山）。生于海拔1200—3000米的山坡及疏林下较湿润的地方。模式标本采自陕西周至。

秦仁昌照片01499（四川城口，Farges in Kew）应是此种，误定为 *St. palustris* Ehrh. et Retz.。

39. 石竹叶繁缕（西藏植物志）

Stellaria dianthifolia Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. **38**: 396. 1908; 西藏植物志 **1**: 698. 1983; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. **7** (1): 79. 1985; C. Y. Wu l. c. **13** (4): 361. 1991. — *St. yunnanensis* Franch. f. *villosa* C. Y. Wu ex P. Ke in Act. Bot. Yunnan. **7**(1): 78. 1985, quoad typo tantum. — *St. yunnanensis* auct., non Franch.; 西藏植物志 **1**: 696. 1983; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. **7** (1): 78. 1985, p. p. quoad pl. Tibet.

多年生草本，高（5—）10—40厘米，全株粉绿色，无毛或被疏柔毛。根较纤细。茎细，铺散或上升，不分枝或上部分枝。叶片线形，长（1—）1.6—4.5厘米，宽2—4毫米，顶端渐尖，基部边缘被缘毛，具明显中脉，下面至少在上部沿中脉密被短柔毛。二歧聚伞花序着生枝端，具6—9花（或以上），疏散；花梗长12—14毫米，中部以下具2苞片；苞片线形，顶端尖，边缘膜质；萼片5，披针状线形，长6—7毫米，顶端渐尖，具3脉，边缘狭膜质；花瓣5，2深裂，裂片狭。蒴果卵圆形；种子小形，扁，耳形，褐色，具带皱纹的粒状凸起。花期6—7月，果期8—9月。

产甘肃（卓尼）、青海（海南州兴海至称多、囊谦）、西藏（类乌齐至那曲及南木林）、四川（乡城、稻城、雅江、康定）。生于海拔（3200—）3350—3800（—4400）米的刺柏林下。模式标本采自西藏。

叶远较 *St. yunnanensis* Franch. 为狭，常较短，线形（稀线状披针形），至少上部叶，叶下面及沿脉密被短柔毛，边缘具倒生柔毛，与 *St. palustris* Ehrh. et Retz. 颇相似，常被误定为该种，但该种几完全无毛，花较小，萼片长3—4（—5）毫米。

40. 长叶繁缕（云南植物研究） 伞繁缕（东北植物检索表），铺散繁缕（内蒙古植物志）

Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. 479. 1806; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. **1**: 392. 1842, p. p.; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **18**