

56d. 多花偃卧繁缕 (变种) (云南植物研究)

var. *polyantha* Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 235. 1874; W. W. Smith et Cave in Rec. Bot. Surv. Ind. 4: 178. 1911; Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 57. 1979; 西藏植物志 1: 702. 1983; Griens. in Fl. Bhutan 1 (2): 208. 1984; P. Ke in Act. Bot. Yunnan. 7 (1): 81. 1985, p. p. min. — *St. cherleriae* (Fisch. ex Ser.) Williams var. *polyantha* (Edgew. et Hook. f.) R. R. Stewart in Kew. Bull. 29: 443. 1974.

叶片钻状披针形或钻状卵形, 被缘毛或柔毛; 聚伞花序紧缩成头状。

产我国西藏 (曲松、扎达)。生于海拔 4 600—5 000 米的砾石滩。不丹、锡金、尼泊尔、印度西北部, 以及克什米尔地区也有。

57. 密花繁缕 (云南植物研究)

Stellaria congestiflora Hara in Journ. Jap. Bot. 52 (7): 195. fig. 2. 1977; Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 57. 1979; C. Y. Wu in Act. Bot. Yunnan. 13 (4): 364. 1991. — *St. semivestita* Edgew. ex Edgew. et Hook. f. var. *brevipetala* L. H. Zhou in C. Y. Wu, Fl. Xizang. 1: 692. tab. 221. fig. 11—15. 1983.

多年生草本, 高 3—20 厘米。茎密丛生, 上部密被白色绒毛。叶片线状披针形, 长 7—13 毫米, 宽 1—3.5 毫米, 顶端渐尖, 具短芒尖, 基部近无柄, 淡绿色, 两面无毛或在茎上部的叶有时被毛, 边缘无毛或疏生缘毛。聚伞花序顶生, 密生多花; 苞片草质; 花梗极短, 稀长达 6 毫米或更长, 被白色绒毛; 萼片 5, 披针形, 长 (4—) 5—6 毫米, 渐尖, 绿色, 边缘白色, 具 3 脉, 无毛或密被白色绒毛; 花瓣 5, 白色, 远短于萼片, 长 1.5—3 毫米, 2 裂几达基部, 裂片线状; 雄蕊 10, 长 1.5—3.5 毫米, 花丝基部宽展, 腺状增厚, 花药卵形, 长 0.3 毫米, 带紫色; 花柱 3, 长达 2 毫米; 子房卵状, 长 0.5—1 毫米, 心皮 6。果实未见。

产我国西藏 (聂拉木、普兰)。生于海拔 3 800—4 100 米的灌丛下砂砾地或石缝中。尼泊尔中部至西部 (海拔 4 200—4 700 米) 也有。模式标本采自 Kali Gandaki, 即在聂拉木及加德满都稍西南。

组 3. 繸瓣组 Sect. *Fimbripetalum* Turcz., Fl. Baic.-Dahur. 1: 236. 1842; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 418. 1936.

植株被伏生绢毛; 花瓣繸状分裂; 蒴果卵球形, 稍长于花萼, 具多数种子。

我国仅有 1 种。

58. 繸瓣繁缕 (拉汉种子植物名称) 垂梗繁缕 (东北草本植物志) 图版 35: 1—4

Stellaria radians L., Sp. Pl. 422. 1753; Ser. in DC. Prodr. 1: 396. 1825; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 378. 1842; Turcz., Fl. Baic.-Dahur. 1: 237. 1842 et in Bull. Soc. Nat. Moscou 15: 608. 1842; Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang.