

Stellaria bistyla Y. Z. Zhao in Bull. Bot. Research 5(4): 142. fig. 1. 1985; C. Y. Wu in Act. Bot. Yunnan. 13(4): 367. 1991. — *St. bistylata* W. Zh. Di et Y. Ren in Act. Bot. Bor.-Occid. Sin. 5(3): 231. 1985.

多年生草本，高10—30厘米。茎密丛生，铺散，叉状分枝，近圆柱形，带紫色，密被腺毛。叶片长圆状披针形，长1—2厘米，宽2—10毫米，顶端急尖，基部渐狭，边缘有毛或无毛，中脉明显，上面下凹，下面凸起。二歧聚伞花序顶生，稀疏；苞片披针形，长1.5—3毫米，两面被腺毛；花梗长3—20毫米；萼片5，长圆状披针形，长4—5毫米，宽约1毫米，顶端尖，边缘宽膜质，外面被短毛或无毛；花瓣5，白色，倒卵形，长约3毫米，宽约2毫米，比萼片短，顶端2浅裂至1/4—1/3处，基部楔形；雄蕊10，长约3毫米；子房球形，1室，具4—5胚珠；花柱2（极少3），长2—3毫米。蒴果倒卵形，长约2.5毫米，短于宿存萼，顶端4（稀6）齿裂，含1（—2）种子；种子卵形至倒卵形，长1.5—1.8毫米，黑褐色，表面具小瘤状凸起。花期7月，果期8月。

产宁夏、内蒙古（贺兰山）。生于海拔2000—2600米的干沟石缝中。模式标本采自贺兰山。

64. 圆萼繁缕（新拟）

Stellaria strongylosepala Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 88: 301. 1939.

多年生草本。茎丛生，近直立，高20厘米，下部分枝，花后变干，粗约2毫米，四棱形，余部纤细，稍挺直，带紫色，仅下部或叶及花序被白色乳凸状微硬毛，下部叶密，上部疏离。叶对生，叶片披针状线形，长达1.5厘米，宽达1.2毫米，顶端急尖，微厚，绿色，边缘啮蚀状，微糙，中脉在上面下陷，下面微凸起，下部叶腋着生缩短小枝或叶簇。二歧聚伞花序，分枝近叉开，极疏离，具5—16花；苞片草质，上部者长不足2毫米；花梗长0.5—1.5厘米，纤细；花萼直径达9毫米，无毛或被乳凸状微柔毛，萼片5，长圆形，宽超过1.5毫米，顶端浑圆，绿色，带蓝紫色，边缘宽膜质，白色，具极细的3脉，脉叉状分枝；花瓣白色，较萼片约短1/3，2深裂至中部，裂片长圆形；雄蕊10，略短于花瓣，着生在肉质、超过半圆的几乎离生花盘裂片上，花药淡黄色，近四方形；子房1室，沿十字线裂成4瓣，胚珠在胎座上略高于稀少（看来4和6）；花柱4，长达花药。蒴果和种子未见（标本未见，据Hand.-Mazz. 原记载译成）。

产内蒙古（三音诺尔，Scharananrin Ula 山脚）。

12. 硬骨草属* *Holosteum* L.

L., Gen. Pl. 39. 1754.

* 硬骨草属（中国种子植物科属词典）。