

7. 五蕊老牛筋 (中国高等植物图鉴补编)

Arenaria potaninii Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 536. tab. 30. fig. 1. 1936; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 355. 1960; 中国高等植物图鉴补编 1: 298. 1982. — *A. pentandra* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 36: 430. 1880 et Mém. Biol. 10: 530. 1880. nec aliorum et Enum. Pl. Mongol. 96. tab. 6. fig. 12 — 28. 1889; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 33: 373. 1898; Krylov, Fl. Sib. Occid. 5: 1034. 1931.

多年生丛生草本，高 20—30 厘米。根粗，木质化，紧密多头。茎多分枝，稍木质化，呈半灌木状，无毛，营养枝具较密的叶。叶片近圆柱状钻形，基生叶长 2.5—4 厘米，茎生叶长 1—1.2 厘米，基部膜质，边缘微粗糙，顶端具硬尖头。顶生三歧聚伞花序，苞片披针形，长 2.5—3 毫米，除中脉外，透明膜质；花梗长 1—2 厘米，无毛；萼片 5，披针形，长 4—4.5 毫米，边缘宽膜质；花瓣 5，白色，长圆形，与萼片近等长或稍长于萼片，顶端钝或近截形；雄蕊 5 (具 5 退化雄蕊)。蒴果卵球形，包于宿存萼内；种子具同心圆的成行瘤状凸起。花期 6—7 月。

产新疆吐鲁番 (长浪沟)。生于海拔 2 400 米的山地阴坡林下。哈萨克斯坦、俄罗斯 (西西伯利亚) 也有。模式标本采自准格尔。

组 2. 毛状叶组 Sect. Capillares McNeill in Not. Bot. Gard. Edinb. 24 (2): 122. 1962. — *Arenaria* L. sect. *Laoniujingae* L. H. Zhou in Bull. Bot. North-East. Forest. Inst. 9: 54. 1980. p. p.

多年生密丛草本。根茎粗大。基生叶莲座状，叶片线状披针形，长 4—8 (—12) 厘米，顶端急尖或渐尖，常变黑暗。花萼几乎全部草质，萼片宽卵形，顶端钝，1 脉，边缘膜质。

我国有 6 种 1 变种，分布于北部和西部。

8. 老牛筋 (东北草本植物志) 毛轴蚤缀 (东北植物检索表)，毛轴鹅不食 (东北草本植物志)，山银柴胡 (吉林省药品标准)，灯心草蚤缀 (拉汉种子植物名称)

Arenaria juncea M. Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 3: 309. 1819; Ser. in DC. Prodr. 1: 408. 1824; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 366. 1842; Turcz., Fl. Baic.-Dahur. 1: 223. 1845; Maxim., Prim. Fl. Amur. 57. 1859; Regel, Pl. Radd. 1: 364. 1861; Maxim. Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. 9: 34. 1873; Franch., Pl. David. 54. 1884; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 70. 1886; Korsh. in Act. Hort. Pétróp. 12: 314. 1891; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 33: 397. 1898; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22 (Fl. Mansh. 2): 187. 1903; Schischk. et Knorr. in Kom. Fl. USSR 6: 529. tab. 29. fig. 5. 1936; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 195. 1939; 北