

地中常见)。生于海拔 3 020—4 600 (—5 200) 米之间的地区。模式标本采自西藏康纳里河谷 (Karnali River)。

11. 华北老牛筋 (新拟) 高原福禄草 (中国高等植物图鉴补编)

*Arenaria grüningiana* Pax et Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 366. 1922, p. p. quoad lectotypo Limpricht 3563 et specim. Hopei tantum; 中国高等植物图鉴补编 1: 298. 1982, p. p. — *A. formosa* Fisch. ex Ser. var. *angustipetala* Maxim., Enum. Pl. Mongol. 98. 1889 et Fl. Tangut. 88. 1889. — *A. formosa* auct., non Fisch. ex DC.; Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 85 (3): 213. 1936, ex Limpr. 600. 2563. fide C. Y. Wu.

多年生草本，密丛生，高 4—10 厘米。主根细长，木质化，支根须状。茎直立，基部宿存密集的枯叶，上部被腺柔毛。基生叶叶片线形，长 1—3 厘米，宽 0.5—1 毫米，基部膜质，呈鞘状，顶端急尖，无毛，中脉明显；茎生叶片披针形，长 3—5 毫米，基部较宽，边缘狭膜质，顶端急尖。花单生顶端；苞片披针形，长 3—4 毫米，宽约 1 毫米，基部较宽，边缘膜质，具缘毛，顶端钝或急尖；花梗长 3—10 毫米，密被褐色腺柔毛；萼片 5，卵状长圆形，长 4—5 毫米，宽 2—2.5 毫米，边缘狭膜质，顶端钝或急尖，外面被腺毛；花瓣 5，白色，倒卵状匙形，长 5—7 毫米，宽 1.5—2 毫米，基部渐狭，呈楔形，顶端钝圆；花盘碟形，具 5 个圆形腺体；雄蕊 10，花丝扁线形，长约 5 毫米，花药椭圆形，黄色；子房倒卵形，长约 1.5 毫米，具柄，花柱 3，线形，长约 2 毫米，柱头棒状。

花期 7 月。

产河北 (小五台山、张家口炮台营一带)、山西 (五寨) 和内蒙古。生于海拔 3 000 米左右的高山草甸。模式标本采自河北小五台山。

12. 美丽老牛筋 (中国高等植物图鉴补编) 美丽蚤缀 (拉汉种子植物名称) 图版 39: 1—4

*Arenaria formosa* Fisch. ex Ser. in DC. Prodr. 1: 402. 1824; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 366. 1842; Maxim., Fl. Tangut. 88. tab. 15. fig. 19—23. 1889; Schischk. et Knorr. in Kom. Fl. USSR 6: 529. 1936; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 354. 1960; McNeill in Not. Bot. Gard. Edinb. 24 (2): 123. 1962; S. K. Czerepanov, Addit. et Corrig. Kom. Fl. USSR 1—30: 154. 1973. — *A. capillaris* auct., non Poir.; Turcz., Fl. Baic.-Dahur. 1: 224. 1845. — *A. formosa* Fisch. ex Ser. var. *latipetala* Maxim., Enum. Pl. Mongol. n. 203. 1889 et Fl. Tangut. 88. 1889.

多年生草本，密丛生，高 4—10 厘米。主根较硬，木质化，支根纤细。茎直立，基部密集枯萎的褐色老叶残基，中、上部被白色腺柔毛，近花序处尤密。叶片线形或线状钻形，长 1.5—4 厘米，宽约 1 毫米，基部较宽，连合成短鞘，边缘平展不卷，顶端渐尖。花 1—3 朵，呈聚伞状；苞片卵状披针形，长 2—3 毫米，宽 1—1.5 毫米，基部较宽，边