

本种与山生福祿草 *A. oreophila* Hook. f. (*A. lichiangensis* W. W. Smith) 相近, 花单生, 稀 2 朵; 萼片卵状披针形, 顶端锐尖, 被腺毛, 具 1—3 脉; 花瓣卵形, 与萼片等长易于区别。

18. 库莽雪灵芝 (中国高等植物图鉴补编)

Arenaria kumaonensis Maxim., Fl. Tangut. 86. 1889, in obs.; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 33: 407. 1898; 中国高等植物图鉴补编 1: 300. 1982.

多年生垫状草本, 高 2—3 厘米。茎密丛生。叶片钻形, 长 2—5 毫米, 宽约 1 毫米, 基部较宽, 边缘不具腺缘毛。花单生, 具短梗, 花梗短于苞片, 被腺状柔毛; 萼片披针形, 长 4—5 毫米, 基部较宽, 顶端钝, 边缘宽膜质, 具 1 脉; 花瓣白色, 椭圆形, 稍长于萼片; 雄蕊 10, 花药黑色; 子房倒卵形, 长约 1.5 毫米, 花柱 3, 线形。花期 7—8 月。

产我国西藏扎达。生于海拔 4 650 米的冰水平台草原。印度西北部也有。模式标本采自印度西北部 (库莽)。

19. 甘肃雪灵芝 (中国高等植物图鉴补编) 甘肃蚤缀 (中国高等植物图鉴) 图版 39: 5—11

Arenaria kansuensis Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 26: 428. 1880 et Fl. Tangut. 86. tab. 14. fig. 13. 1889; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 70. 1886; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 33: 402. 1898 et l. c. 34: 436. 1900 et l. c. 38: 400. 1909; Pax et Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 366. 1922; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 195. 1929; Kobuski in Journ. Arn. Arb. 14: 9. 1933; 中国高等植物图鉴 1: 622. 图 1244. 1972; 秦岭植物志 1 (2): 193. 图 162. 1974; Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 51. 1979; 西藏植物志 1: 675. 1983. — *A. kansuensis* Maxim. var. *acropetala* Y. W. Tsui et L. H. Zhou in Act. Phytotax. Sin. 18 (3): 359, tab. 3. fig. 8—10, cum var. *ovatipetala* Y. W. Tsui et L. H. Zhou l. c. fig. 6—7. 1980; 中国高等植物图鉴补编 1: 300. 1982; 西藏植物志 1: 675. 1983.

多年生垫状草本, 高 4—5 厘米。主根粗壮, 木质化, 下部密集枯叶。叶片针状线形, 长 1—2 厘米, 宽约 1 毫米, 基部稍宽, 抱茎, 边缘狭膜质, 下部具细锯齿, 稍内卷, 顶端急尖, 呈短芒状, 上面微凹入, 下面凸出, 呈三棱形, 质稍硬, 紧密排列于茎上。花单生枝端; 苞片披针形, 长 3—5 毫米, 宽 1—1.5 毫米, 基部连合呈短鞘, 边缘宽膜质, 顶端锐尖, 具 1 脉; 花梗长 2.5—4 毫米, 被柔毛; 萼片 5, 披针形, 长 5—6 毫米, 基部较宽, 边缘宽膜质, 顶端尖, 具 1 脉; 花瓣 5, 白色, 倒卵形, 长 4—5 毫米, 基部狭, 呈楔形, 顶端钝圆; 花盘杯状, 具 5 个腺体; 雄蕊 10, 花丝扁线形, 长约 4 毫米, 花药褐色; 子房球形, 1 室, 具多数胚珠, 花柱 3, 线形, 长约 3 毫米。花期 7 月。

产青海、西藏东部 (拉萨以东至江达)、甘肃南部 (舟曲、宕昌)、四川西部 (雀儿