

37. 团状福祿草 (新拟) 团状雪灵芝 (中国高等植物图鉴补编), 金发藓状蚤缀 (拉汉种子植物名称)

Arenaria polytrichoides Edgew. ex Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 237. 1874; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 33: 404. 1898, excl. β . et l. c. 34: 436. 1900 et l. c. 38: 401. 1909; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 457. 1905; W. W. Smith et Cave in Rec. Bot. Surv. Ind. 4: 179. 1911; Pax et Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 366. 1922; Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 51. 1979; 中国高等植物图鉴补编 1: 301. 1982; 西藏植物志 1: 679. 1983.

多年生垫状草本, 呈半球形, 高 2.5—11 厘米, 直径 10—15 厘米。主根粗壮, 木质化。茎圆柱形, 紧密丛生, 基部木质化, 除顶部外, 枝上枯叶密集, 几成坚硬实体。叶片钻形, 长 0.5—1 厘米, 宽不足 1 毫米, 密集成覆瓦状排列, 基部较宽, 膜质, 抱茎, 边缘较厚, 近基部被疏缘毛, 上面凹入, 下面凸起, 顶端具硬尖, 基部以上向外反曲。花单生枝端, 无梗; 苞片披针形, 长 2.5—3 毫米, 宽约 1 毫米, 基部较宽, 呈膜质鞘状, 抱茎, 边缘反卷而成硬边, 顶端具刺状尖头; 萼片 5, 宽椭圆形、卵状椭圆形或卵形, 长约 3 毫米, 基部较宽, 顶端钝, 具不明显的 3 脉; 花瓣 5, 白色, 宽倒卵形或倒卵形, 长于萼片; 花盘盂状, 具 5 个深色腺体; 雄蕊 10, 花丝扁线形, 长约 1.5 毫米, 花药黄色; 子房卵圆形或倒卵形, 长约 1 毫米, 花柱 3, 长约 1 毫米。蒴果卵圆形, 长约 1.5 毫米, 3 瓣裂, 裂瓣顶端 2 裂; 种子椭圆形, 微具棱, 黑褐色。花期 6—7 月, 果期 8—9 月。

产西藏 (错那、亚东、定结、定日、尼木、南木林、萨噶、仲巴、曲松、那曲、申扎)、四川西部 (九龙、稻城、巴塘、康定)、青海东南部 (果洛)。生于海拔 3 500—5 300 米的高山草甸、倒石堆和碎石带。锡金也有。模式标本采自亚东帕里春丕塘一带。

亚属 5. 单花亚属 Subgen. *Solitaria* McNeill in Not. Bot. Gard. Edinb. 24 (2): 128. 1962. — *Arenaria* L. subgen. *Euarenaria* sect. *Sikkinenses* Williams in Bull. Herb. Boiss. 3: 600. 1895.

多年生草本。植株丛生或密丛生, 但绝非垫状。叶片卵形或卵圆形, 顶端急尖至渐尖。花单生, 大而美观; 萼片大于 5 毫米, 通常顶端及边缘变硬。

我国有 6 种 3 变型, 分布于西南地区。

38. 缘毛无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 图版 45: 6—11

Arenaria ciliolata Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 240. 1874; W. W. Smith et Cave in Rec. Bot. Surv. Ind. 4: 179. 1911 et l. c. 4: 356. 1913; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 33: 373. 1898; Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 51. 1979; 中国高等植物图鉴补编 1: 305. 1982; 西藏植物志 1: 684. 图 215: 7—12. 1983.